2021

منظمة أطباء بلا حدود

فيروس نقص المناعة البشرية
والسل

دمج فيروس نقص المناعة البشرية / السل وثيقة إرشادية مرحلية

ملف متقاطع

تصديق المنصة و التاريخ	Dirmed, 27.01.2020
حالة النشر	داخلي
النسخة	V1
اللغة	عربية
المؤلف	E. C. Casas, L. Moretó Plana, C. Ssonko,
للتواصل بخصوص الوثيقة	Charles Ssonko
	charles.ssonko@london.msf.org
للحصول على نسخة الكترونية	

مساهمات أخرى:

التحرير: Silvia De Weerd

Contributors: Anita Mesic, Elisabeth Szumilin, Elkin Bermudez Aza, Erin Stratta, Erwan Piriou, Jay Achar, Jarred Halton, Laura Sannino, Alex Telnov, Sonia Mairos, Suna Balkan, Zee Ndlovu, Beatriz Alonso, Philippe Blasco, Amin Lamrous, Eva Deplecker, Gilles Van Cutsem.

تم اختبار هذه الوثيقة الإرشادية قبل نشرها من قبل العديد من موظفي منظمة أطباء بلا حدود الميدانيين ، و الذين هم المستخدمون المستهدفون. نحن مدينون لهم بالشكر الجزيل لتعليقاتهم القيمة.

جدول المحتويات

المصطلحات.....	Error! Bookmark not defined.
التعريف.....	Error! Bookmark not defined.
المقدمة.....	Error! Bookmark not defined.
كيف يعمل هذا المستند.....	Error! Bookmark not defined.
التقييم: I القسم.....	Error! Bookmark not defined.
فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل على المستوى الدولية.....	Error! Bookmark not defined.
....تقييمات محددة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في منطقة تجمع المياه حول المشروع defined.	Error! Bookmark not defined.
تقييم المشروع.....	Error! Bookmark not defined.
استراتيجية متكاملة (تصميم المشروع): الجزء الثاني.....	Error! Bookmark not defined.
9..... استراتيجيات التنفيذ	9
الأثر التشغيلي.....	Error! Bookmark not defined.
الموارد البشرية.....	Error! Bookmark not defined.
التدريب.....	Error! Bookmark not defined.
14..... العرض: أدوات الطلب والجدول الزمني	14
التمويل: التكاليف وآليات التمويل الوطنية.....	Error! Bookmark not defined.
15..... استراتيجية الخروج	15
السل / الإيدز تكييف الخدمات المتكاملة القائمة.....	Error! Bookmark not defined.
السجل والحد الأدنى من المؤشرات القياسية.....	Error! Bookmark not defined.
16..... حالات خاصة: الجزء الثالث	16
17..... الإيدز/ السل الطوارئ و العلاج	17
17..... التخطيط للطوارئ	17
تدخل طارئ جديد – بدون وجود مشروع مسبقًا.....	Error! Bookmark not defined.
الطوارئ / عدم الاستقرار في مشروع موجود مسبقًا.....	Error! Bookmark not defined.
20..... السكان المتنقلون	20
الإيدز / السل النشاطات: الجزء الرابع.....	Error! Bookmark not defined.
الإيدز العناية.....	Error! Bookmark not defined.
العناية السل.....	Error! Bookmark not defined.
الوقاية.....	Error! Bookmark not defined.
اكتشاف الحالة واختبارها.....	Error! Bookmark not defined.
علاج الإيدز.....	Error! Bookmark not defined.
علاج السل.....	Error! Bookmark not defined.
ملاحظة على التغذية.....	33

دعم المريض والتثقيف والاستشارة (PSEC).....	Error! Bookmark not defined.
المشكلة المجتمعية & (HP) تعزيز الصحة (CE)	35
المختبر.....	Error! Bookmark not defined.
المراقبة والتقييم	41
الملحقات	Error! Bookmark not defined.
ادوات التقييم : 1 الملحق	43
أداة حساب طلب أدوية فيروس نقص المناعة البشرية:2 الملحق	Error! Bookmark not defined.
مجموعة أدوات الطوارئ المتقاطعة لخمسين مريض فيروس نقص المناعة البشرية / السل :3 الملحق	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
أمثلة على تخطيطات / تنظيم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية / السل على مستوى المستشفى وعيادة :4 الملحق الرعاية الصحية الأولية.....	Error! Bookmark not defined.
قائمة الموارد المتاحة / المبادئ التوجيهية :5 الملحق	Error! Bookmark not defined.
مثال على التمويل:6 الملحق	Error! Bookmark not defined.
دراسات الحالة :7 الملحق	Error! Bookmark not defined.

قائمة المصطلحات

A/C	مكيف
AEB	التعرض العرضي للدم
ALT	ألانين ترانساميناسيس
ANC	رعاية ما قبل الولادة
ART	العلاج المضاد للفيروسات
ASAP	بأسرع ما يمكن
ATT	علاج مضاد لمرض السل
AZT	زيدوفودين
BCG	Bacillus Calmette–Guérin
BHC	الرعاية الصحية الأساسية
CAGs	مجموعات الفن المجتمعية
CHW	موظف صحة مجتمعية
CO	مسؤول الطب السريري
CrAg	المكورات الخفية اختبار المستضد
CSF	السائل النخاعي
CSW	بائعة الهوى
CTX	كو تريموكسازول
CXR	تصوير الصدر بالأشعة السينية (تصوير الصدر بالأشعة)
DBS	بقعة دم جافة / عينة
DOT	العلاج الخاضع للمراقبة المبلثرة
DHIS	نظام المعلومات الصحية للمنطقة
DR TB	السل المقاوم للأدوية
DS TB	داء السل الحساس للأدوية
DSD	تقديم الخدمة المتمايزة
DST	اختبار الحساسية للأدوية
ECG	تخطيط القلب الكهربائي
EID	التشخيص المبكر للرضع
EMR	السجل الطبي الإلكتروني
EPI	برنامج المناعة الموسع
EPTB	السل خرج الرئة
FASH	تقييم تفصيلي مع التصوير فوق الصوتي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل
FDC	توكيبة الجرعة الثابتة
FieldCo	المنسقون الميدانيون
GFATM	الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا
HB	الهييموغلوبين
HC	مركز صحي
HCT	استشرات وفحص فيروس نقص المناعة البشرية
HIS	نظام المعلومات الصحية
HIV	فيروس نقص المناعة البشرية
HIVST	الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية
HP	تعزيز الصحة
HQ	المكاتب الرئيسية
HR	الموارد البشرية
ID	بطاقة الهوية (للمريض)
IEC	ايصال المعلومات التعليمية
IPC	ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها
IPD	قسم المرضى الداخليين
IPT	العلاج الوقائي باستخدام الأيزونيزيد

ITFC	مركز التغذية العلاجية للمرضى الداخليين
KA	Kala Azar
LAB	المختبر
3TC	لاميفودين
LTBI	عدوى السل الكامنة
LFU	فقد في المتابعة
MAM	مدير النشاط الطبي
MD	طبيب
MDR TB	السل المقاوم للأدوية المتعددة
M&E	متابعة وتقييم
MoH	وزارة الصحة
MoU	مذكرة تفاهم
MSF	منظمة أطباء بلا حدود
MSM	الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال
MTL	قائد الفريق الطبي
NAT	اختبار الحمض النووي
N95	كمامة مانعة للجسيمات
NCD	امراض غير معدية
NGO	منظمة غير حكومية
NNRTI	مثبطات النسخ العكسي غير النوكليوزيدية
NVP	نيفيرابين
OI	العدوى الانتهازية
OPD	قسم العيادات الخارجية
PC	منسق المشروع
PCR	تفاعل البلمرة المتسلسل
PEP	الوقاية بعد المرض
PREP	الوقاية قبل المرض
PEPFAR	خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز
PI	مثبطات الأيزيم البروتيني
PICT/PITC	مزود الاستشارة الاختبار المبدئي
PHC	الرعاية الصحية الأولية
PLWHIV	الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
PMR	المرجع الطبي للمشروع
PMTCT	الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل
PoC	نقطة الرعاية
POCUS	نقطة الرعاية بالموجات فوق الصوتية
PODI	المجتمعية TARV محطة توزيع
PPE	معدات الحماية الشخصية
PWTB	مرض السل
QA	ضمان الجودة
QTc	QT (مصحح) فاصل
RDT	اختبار التشخيص السريع
RR	مقاومة ريفامبيسين
SAM	سوء التغذية الحاد الشديد
SAMU	(MSF) الوحدة الطبية للجنوب الأفريقي
SAT	العلاج الذاتي
SGBV	العنف الجنسي والجسدي
SNRL	سوبرا المختبر المرجعي الوطني
SL	الخط الثاني
SRH	الصحة الجنسية والإنجابية
STI	الأمراض المنقولة جنسيا
TB	مرض السل

TDF	تينوفوفير ديسوبروكسيل فومرات
TSH	هرمون تحفيز الغدة الدرقية
U5	أقل من 5 سنوات
UNAIDS	برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز
UNHCR	مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
UNICEF	صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة
VCT	الإرشاد والاختبار الطوعي
VL	العقبى أو الحمل الفيروسي
WHO	منظمة الصحة العالمية
XDR TB	السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع

تعريفات

الفئات المعرضة للخطر / الفئات الضعيفة:

درجة التأثر هو درجة عدم قدرة السكان أو الأفراد أو المنظمات على توقع آثار الكوارث والتعامل معها ومقاومتها والتعافي منها. (الأمراض)¹. عادة ما يكون مصطلح "الفئات الضعيفة" مرادفًا لمصطلح "المجموعات المعرضة للخطر". تعتبر المجموعة بشكل عام معرضة للخطر بسبب وجود سبب وجيه للشك في أن الأفراد في المجموعة قد يعانون من صعوبات خاصة تتعلق بالصحة.

المسؤول الطبي عن المشروع (PMR) / قائد الفريق الطبي (MTL):

ضمن مشاريع منظمة أطباء بلا حدود ، فإن PMR / MTL هو موظف مسؤول عن الإدارة الوظيفية (والتسلسلية في كثير من الحالات) (الإشراف والتدريب) لجميع الطاقم الطبي وعن جودة وتنفيذ جميع الأنشطة الطبية على مستوى المشروع. يعتمد ما إذا كان اسم هذا المنصب هو PMR أو MTL على قسم MSF الذي يدير المهمة.

أصحاب المصلحة:

صاحب المصلحة هو أي مؤسسة أو منظمة لها مصلحة أو دور في الأنشطة التي نعمل عليها ، على سبيل المثال وزارة الصحة والمنظمات المحلية والدولية الأخرى والمجتمعات ومجموعات المرضى

تقديم الخدمة المتميزة (DSD):

الرعاية المتميزة هي نهج يركز على العميل ببسط ويكيف خدمات فيروس نقص المناعة البشرية / السل عبر سلسلة الرعاية لتعكس التفضيلات والتوقعات ولتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (PLWHIV) مع تقليل الأعباء غير الضرورية على الصحة النظام. من خلال توفير رعاية متميزة ، يمكن للنظام الصحي إعادة توكيز الموارد على من هم في أمس الحاجة إليها.

نقطة الرعاية (PoC):

هو مصطلح يستخدم لتحديد أدوات ومعدات المختبرات ومعدات / آلات واختبارات المختبرات التي يمكن إتاحتها في موقع المعالجة ؛ بما في ذلك بشكل مثالي بجانب السرير أو في المختبر المحلي للمنشأة الصحية. تكون اختبارات نقطة الرعاية بشكل عام خالية من المعدات (مثل RDT) أو تحتوي على معدات بسيطة جدًا تعمل بالبطاريات (مثل مقياس السكر). تعتبر الاختبارات الأخرى التي تتضمن معدات تتطلب مصدر طاقة و / أو درجة حرارة مضبوطة بشكل عام قريبة من نقطة الرعاية ، ولن تكون متاحة إلا عند وجود مختبر مخصص (على مستوى المستشفى ، أو في بعض الأحيان أكثر لامركزية في المشريع الرأسية مع حجم كبير من المرضى).

الأزواج المتنافرين:

عندما يكون أحد الزوجين متفاعلاً مع الاختبار بينما الآخر سلبي.

¹ https://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/

السل LAM :

اختبار سريع لمرض السل يتم إجراؤه على البول (يتفاعل مع مستضدات سطح خلايا عصيات السل تسمى Lipoarabinomannan).

كمامة مانعة للجسيمات (N95):

قناع مصمم لمنع جزيئات السل (نوى القطرات) التي يقل قطرها عن 5 ميكرومتر من المرور. يجب أن يرتدي هذا من قبل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون في مناطق انتقال عالية للعدوى.

GeneXpert الاسم التجاري (Xpert MTB/RIF) :

اختبار قريب من الرعاية ل MTB / RIF : يشخص السل ومقاومة الريفامبيسين في أقل من ساعتين. إنه الاختبار الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية كخط أول لتشخيص مرض السل ، عندما تسمح المورد بذلك. يمكن أيضًا توسيع منصة Xpert باستخدام لفائف لإجراء اختبار الحمل الفيروسي HIV-1 و EID

PIMA :

نقطة قريبة من أداة الرعاية لتحديد عدد CD4.

اختبار التشخيص السريع (RDT):

اختبار خالي من الأدوات في شكل شريط أو كاسيت ، يهدف إلى اكتشاف استجابات الأجسام المضادة أو المستضدات. يتكون من غشاء (نيتروسليلوز بشكل عام) مغطى بمولدات المضادات (لاكتشاف الأجسام المضادة ، على سبيل المثال RDT HIV-1 مثل Determine أو Unigold) أو الأجسام المضادة (للكشف عن المستضدات ، مثل TB-LAM) ، والكواشف التي تتيح التفسير البصري للاختبار.

سفراء مرض السل:

من ذوي الخبرة PWTB الذين أكملوا العلاج بنجاح.

جواز سفر فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل:

وثيقة مملوكة للمريض ومعبأة من قبل الطبيب المعالج / الممرضة التي تحتوي على معلومات فيروس نقص المناعة البشرية / السل الخاصة بالمريض على البطاقة لتمكينهم من مواصلة العلاج مع مقدمي الخدمات الآخرين. يتم استخدامها في مواقف خاصة مثل حالات الطوارئ (انظر التخطيط للطوارئ) ، للسكان المتنقلين ، إلخ.

المقدمة

هذه الوثيقة كما تمت كتابتها قبل حالة الطوارئ الخاصة بفيروس COVID ، من أجل دمج أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل وتكييفها بسبب COVID 19 ، يرجى اتباع إرشادات القسم C19 وتوجيه مجموعة العمل الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في الملحق 5.

يساهم فيروس نقص المناعة البشرية / السل في معدلات الاعتلال والوفيات الكبيرة في مشاريع الرعاية الصحية الأساسية لمنظمة أطباء بلا حدود ، لا سيما عندما يكون انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أكبر من 1٪ وحدوث السل < 20 / 100,000 نسمة. التزمت منظمة أطباء بلا حدود التزامًا قويًا بدمج رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل في المشاريع التي لا تتوفر فيها هذه الرعاية.² قد يكون دمج رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل في المشاريع ذات التركيز الطبي الأوسع والمختلف ، مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية ، وبرامج الصحة الإنجابية والتغذية ، أمرًا صعبًا. ضمن تلك الأولويات المتنافسة ، يجب أن تظل رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل محط وُكيز وأن يتم وُكيبها بكفاءة على المستوى الميداني لتجنب الأساليب المعقدة بشكل مفرط وتعظيم الفرص المتاحة.

في هذا الاتجاه من التفكير ، تمت مناقشة نهج "الحد الأدنى من الحزمة" لإرشادات منظمة أطباء بلا حدود لعام 2015 حول تكامل رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل³ إن التغيير السريع في المعايير الدولية ، والابتكارات المستمرة في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل مثل تقديم الخدمات المتميزة والتنوع في كل سياق ، تحدى نهج الحزمة الدنيا "الثابتة". بدلاً من ذلك ، تم اتخاذ خيار لمراجعة الدليل الحالي في أداة / دليل لتمكين المجال من اكتشاف و "تصميم" الحزمة المرغوبة لأي مشروع من أجل دمج رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل.

تنقسم الوثيقة إلى أربعة أجزاء ، مع اتباع نهج خطوة بخطوة ؛ التقييم واستراتيجية التنفيذ والسياقات الخاصة ونظرة عامة على أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل. تهدف الوثيقة إلى تلخيص وإعطاء نظرة عامة لمساعدة المنسقين الطبيين والتشغيليين على إعداد مكون تكامل رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل ضمن مشروعهم (مشروعهم) أو مهمتهم (مهامهم). للحصول على تفاصيل حول عمليات التنفيذ والتعليمات السريرية ، يشير كل فصل إلى الإرشادات (السريرية) المقابلة. كل قسم من أقسام منظمة أطباء بلا حدود لديه متخصصون في فيروس نقص المناعة البشرية والسل ويوصى بشدة باستشارتهم خلال جميع خطوات الدمج ؛ التصميم والعمليات التي يجب اتخاذها (وبعدها).

الافتراضات الرئيسية:

- الجمهور المستهدف لهذه الوثيقة هو أي موظف تشغيلي و / أو طبي ، بغض النظر عن خبرته في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل ، والتي تهدف إلى دمج رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل في مشروعهم.
- يجب الموافقة على أي تعديلات في المشروع أو مكونات جديدة أولاً من خلال الإجراءات المعيارية لقسم منظمة أطباء بلا حدود المعني (مقترحات المشروع / كوبرو ... إلخ). تفترض هذه الوثيقة هذه الموافقة أو النية لتقديم اقتراح مشروع للموافقة عليه.
- تهدف الوثيقة إلى أن تكون أداة تنفيذ ، توفر للقرئ أدوات وإرشادات حول كيفية تصميم مكون فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. لا يحل محل الإرشادات السريرية المتاحة لفيروس نقص المناعة البشرية / السل.
- بينما يشير العنوان إلى تكامل شامل لفيروس نقص المناعة البشرية والسل ، يمكن استخدام العناصر الفردية منه واستخلاصها من هذه الوثيقة للسماح بالإجابة على احتياجات أكثر تحديداً لتكامل مكونات معينة من الرعاية (مثل السل وغير فيروس نقص المناعة البشرية و TB).

أي ملاحظات: Charles Ssonko at charles.ssonko@london.msf.org; Esther C. Casas at esther.casas@joburg.msf.org; Laura Moretó Planas at laura.moreto@barcelona.msf.org

كيف يعمل هذا المستند

يبدأ الجزء الأول من هذه الوثيقة بتقييم حالة فيروس نقص المناعة البشرية والسل في بلد البعثة ومنطقة مستجمعات المياه والمشروع نفسه. من هذا التقييم ، يجب أن تتضح الاحتياجات / الفجوات والفرص فيما يتعلق برعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، وتشكل الأساس لتصميم البرنامج.

² MSF TB political statement, September 2017, and HIV strategic framework, January 2019

³ MSF programmatic guide 'Integrating HIV & TB care in basic health care package in MSF projects' 2015

يقدم الجزء الثاني استراتيجيات تنفيذ مختلفة وينظر في عوامل التأثير التشغيلي المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تصميم تكامل المكونات ، مثل الموارد البشرية والتدريب والإمدادات والتمويل. ولكن أيضًا الاعتبارات المتعلقة بالتقييمات (إعادة) المنتظمة ، وتوسيع النطاق واستراتيجية الخروج.

يتركز الجزء الثالث على خطة الطوارئ ودمج فيروس نقص المناعة البشرية / السل في المواقف الخاصة مثل حالات الطوارئ ، والأوضاع غير المستقرة والسكان الرحل أو المهاجرين.

يقدم الجزء الرابع لمحة عامة عن أنشطة رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل. يتم تقسيم الأنشطة إلى فصول من مكونات الرعاية ، مثل الوقاية والاختبار والعلاج ، إلى آخره. يورد كل مكون عددًا من خيارات النشاط للاختيار من بينها. تحتوي الخيارات على مستويات مختلفة من التعقيد ويتم تفصيلها في لبنات البناء ، "ماذا / أين / لمن / متى / من قبل من" ومزيد من الشرح في النص التالي.

الجزء الأول: التقييم

هناك ثلاثة مجالات مهمة لتقييمها قبل تصميم مكون متكامل لكل من فيروس نقص المناعة البشرية / السل. يحتوي الملحق 1 على أدوات التقييم المطابقة لمختلف المجالات ؛ تقييم المشروع على المستوى الوطني ومنطقة مستجمعات المياه. بشكل عام ، تغطي التقييمات ما يلي:

التقييم على المستوى الوطني

علم الأوبئة

السياسات الوطنية

الجهات مانحة/ التمويل

تقييم منطقة مستجمعات المياه

خدمات السل / الإيدز

وزارة الخارجية و

أصحاب المصلحة الآخرين

تقييم المشروع

قدرات المشروع

المرضى

المجتمع المحلي

سياق فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل على المستوى الوطني

لدى معظم البلدان سياسات وطنية وإرشادات عيادية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والسل. عادة ما يعرف المنسق الطبي أو يقيم في هذا المستوى. قد تكون هناك توجيهات واضحة من وزارة الصحة حول نظم العلاج التي يجب استخدامها وتعليمات عيادية وبرامجية أخرى. من المهم جدًا أن تكون على دراية بهذه الأمور وتصفحها مع مستشار / أخصائي / مستشار فيروس نقص المناعة البشرية / السل الخاص بك (بعد هذا يسمى "المرجع") ، لتقييم مكان تداخلها مع سياسات وإرشادات منظمة أطباء بلا حدود وكيفية التعامل مع أي اختلافات. المعلومات الهامة الأخرى على المستوى الوطني هي الوبائيات العامة لكل من الأمراض وأي جهات مانحة / آليات تمويل وتنسيق يمكن أن يكون لها أدوار مؤثرة.

تقييمات محددة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في منطقة مستجمعات المياه حول المشروع

تركز الأسئلة الواردة في أداة التقييم في الملحق 1 على الخدمات المتاحة في منطقة تجمع المشروع ، بما في ذلك مشروع منظمة أطباء بلا حدود نفسه وأي مرافق تابعة لوزارة الصحة أو أصحاب المصلحة الآخرين. يتناول بالتفصيل المكونات المختلفة لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، مثل الاختبار والعلاج والوقاية وتثقيف المرضى وتقديم المشورة لهم والمشاركة المجتمعية. سيوضح هذا ما إذا كانت هناك ثغرات في الرعاية وأين توجد بها ، كما يشير إلى المكان الذي قد يكون لتقديم خدمات منظمة أطباء بلا حدود فيه قيمة مضافة. إذا كانت هناك عيادات أخرى ذات رعاية جيدة لفيروس نقص المناعة البشرية ، فقد تختار إحالة المرضى ، أو دمج مكونات معينة فقط غير متوفرة في أي مكان آخر في منطقة التجمع. لاحظ أنه غالبًا ما يتم فصل خدمات مرض السل عن خدمات رعاية فيروس نقص المناعة البشرية وأن مصادر المعلومات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن تكون مختلفة بالنسبة لمرض السل. لذلك ، على الرغم من أن بعض الأساسيات لكلا المرضين قد تكون متشابهة ، إلا أن جمع البيانات والاجتماع مع المخبرين الرئيسيين والشركاء المنفذين قد يختلف.

تقييم المشروع

إلى جانب تقييم وبائيات فيروس نقص المناعة البشرية والسل ، والسياسات ، وتقديم الخدمات على مستوى الدولة وفي منطقة مستجمعات المياه ، فأنت بحاجة إلى جرد للخيارات والفرص في المشروع حيث يتم النظر في التكامل. ربما توجد

بالفعل عناصر أو أدوات لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، على سبيل المثال تم تدريب بعض الموظفين أو عملوا مع فيروس نقص المناعة البشرية / السل من قبل؟ هل يوجد معمل للمشروع وما نوع الاختبارات المتوفرة؟ سيعتمد نجاح خطة الدمج أيضًا على فهم احتياجات المرضى. ما نوع المرضى الذين تتوقع أن يكونوا بحاجة إلى رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل؟ هل لديهم احتياجات خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية؟ هل هناك مجموعات ضعيفة ، مثل المشتغلين بالجنس أو المهاجرين؟ أو هل تتوقعين أن العديد من النساء الحوامل معرضات للخطر ، أو المراهقات ، أو الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية؟ يعد تحديد من هم المرضى وما يحتاجون إليه أمرًا مهمًا للتصميم البرنامجي بأكثر من طريقة. أولاً ، من خلال إبقاء المرضى واحتياجاتهم في مركز التصميم الخاص بك ، لزيادة جودة الرعاية ، ولكن أيضًا من وجهة النظر البرمجية لتصميم خدماتك بطريقة أكثر كفاءة. وهذا ما يسمى DSD أو تقديم الخدمة المتميزة⁴

العامل الرئيس الآخر في سياق المشروع هو بالطبع المجتمع العام الذي تخدمه. هل هم على علم بفيروس نقص المناعة البشرية والسل؟ هل هناك وصمة عار حول هذه الأمراض أم أن المجتمع يشارك بنشاط في أنشطة الوقاية؟

سيحدد استقرار سياق المشروع ما إذا كان بإمكانك دمج مكون مستقر لفيروس نقص المناعة البشرية / السل أو إذا كنت بحاجة إلى مراعاة الظروف الخاصة ، مثل عدم الاستقرار أو حالات الطوارئ أو السكان المتنقلين / الرحل. على أي حال ، من الجيد دائمًا إعداد خطة طوارئ ، حتى لو كان الوضع المحيط مستقرًا. يمكنك قراءة المزيد عن التوصيات الخاصة بالسياقات الخاصة والتخطيط للطوارئ في الجزء الرابع من هذه الوثيقة.

⁴ <http://www.differentiatedcare.org/Resources/Library>

الجزء الثاني: استراتيجية التكامل (تصميم المشروع)

بعد التقييم وإلقاء نظرة شاملة على خيارات النشاط ومتطلباته ، يجب أن يكون من الواضح الآن ما يجب تضمينه في مكون تكامل رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل. بالطبع ، يسبق أي تنفيذ فعلي مناقشة ومشورة واتفاق بين المشروع / المهمة والخلية / المكاتب والمستشارين المشركين في المهمة.

استراتيجيات التنفيذ

هناك طرق مختلفة للشروع في دمج أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، ولا يوجد بالضرورة خيار واحد أفضل من الخيارات الأخرى. ما تختاره يعتمد على نتائج التقييم والإمكانيات في المشروع. هناك استراتيجيتان أساسيتان: دمج الأنشطة في الأقسام الطبية الأخرى في المرفق الصحي أو إدخال برنامج عمودي صغير (خدمات تديرها بشكل مستقل مخصصة بالكامل لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل):

1. الاندماج في الأنشطة الأخرى هو تكامل حقيقي أكثر ، حيث تصبح رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل جزءًا من الأنشطة الطبية العادية. يتم تقديم الرعاية من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون أيضًا الرعاية الطبية الحالية ، في نفس المكان (العيادات الخارجية ، والعيادات الخارجية ، وما إلى ذلك). يوضح الملحق 4 مثالًا مرئيًا لكيفية دمج الأنشطة على مستوى المشفى والطب السريري.
2. برامج عمودية صغيرة ضمن المشروع الأكبر. فريق صغير ، على سبيل المثال ممرضة مخصصة أو مسؤول عيادي ومستشار ، يدعمه طبيب في المشروع (أو عن بعد) ، يعتني بالمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل بالتوازي مع أنشطة المشروع الأخرى. حتى لو لم تكن هذه هي النتيجة النهائية المقصودة للتكامل ، فقد تكون طريقة جيدة لبدء أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل.

اعتبارات التنفيذ:

1. خيارات الإحالة: يُظهر التقييم ما إذا كانت هناك أنشطة رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل متاحة من خلال وزارة الصحة و / أو جهات فاعلة أخرى في المنطقة المجاورة. قد لا تكون هناك خيارات ضمن مسافة معقولة من المشروع ، أو مزيج من الخيارات ، تختلف في الجودة ومستويات الرعاية. بناءً على خيارات الإحالة هذه ، يمكنك اختيار الأنشطة المراد دمجها ومتى يتم الرجوع إليها. ضع في اعتبك أنه إذا اخترت الإحالة ، فيجب أن تكون لديك فكرة جيدة عن جودة الرعاية في موقع الإحالة وخطة حول كيفية متابعة الإحالات.
2. النهج التدريجي: يمكن إعداد مكونات فيروس نقص المناعة البشرية والسل من الصغيرة إلى الكبيرة ، ومن الأساسي إلى أفضل الممارسات. توضح النظرة العامة في الجزء الرابع الخيارات المختلفة. قم بتضمين جدول زمني في الإستراتيجية ونهج تدريجي لتنفيذ الأنشطة بوتيرة تناسب احتياجات المشروع وموارده.
3. يمكن أيضًا مراعاة الاندماج في حالات مزمنة أخرى مثل الأمراض غير المعدية والصحة العقلية وما إلى ذلك اعتمادًا على أولويات المشروع.
4. DSD⁵: يمكن أن يؤدي تقديم الخدمات المتميزة إلى جعل الخدمات تعمل بشكل أكثر فاعلية - سواء بالنسبة للمشروع أو للمرضى. من التقييم يجب أن تظهر صورة للمرضى الذين يمكن أن تتوقع تضمينهم في مشروع رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل. بناءً على هذه الملفات الشخصية ، يمكنك استكشاف طرق تبسيط الرعاية في النماذج التي تناسب هؤلاء المرضى.
5. خطة الطوارئ: يعد استقرار ظروف المشروع عاملاً هاماً للاستراتيجية والتنفيذ. يحتوي الجزء الثالث من الظروف الخاصة على مزيد من المعلومات والتوصيات المحددة حول السياقات غير المستقرة. ولكن حتى المشروع في سياق مستقر يحتاج إلى خطة طوارئ يتم إعدادها في حالة تغير الظروف. انظر الجزء الرابع لمزيد من التفاصيل.
6. الدعم: يوجد في كل قسم من أقسام منظمة أطباء بلا حدود منسقون طبيون ومستشارون صحيون ومراجعون لفيروس نقص المناعة البشرية / السل. هناك أيضًا متخصصون يمكنهم البقاء لفترة أطول في الميدان للمساعدة في إعداد أنشطة مكونة معينة ، مثل مسؤولي تنفيذ الأجهزة المحمولة (MIO) أو المنفذون الطائرون. بجانب ذلك ، لا تنسَ بالطبع أن تنظر حولك في البلد الذي تتواجد فيه ، حيث يمكن أن توفر آليات التمويل ووزارة الصحة الكثير من الفرص ، مثل التدريب على فيروس نقص المناعة البشرية / السل.

⁵ <http://www.differentiatedcare.org/Resources/Library>

التأثير التشغيلي

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسئلة حول التأثير التشغيلي المحتمل لمكون مشروع جديد. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتمويل والموارد البشرية وتسجيل المورد في المشروع والرسالة؟ هل يمكن أن يكون هناك تأثير على الخدمات الصحية المحيطة؟ هل سيكون لها تأثير على الجدول الزمني المقصود للمشروع؟

في حين أن الإجابة "أنه يعتمد..." قد تكون صحيحة - حيث تختلف الأشياء اختلافاً كبيراً من سياق إلى آخر - ، إلا أنها لا تعطي أي معلومات مفيدة عند تصميم مكون تكامل. لذلك حاولنا هنا في الجزء الثاني ، تقديم مزيد من المعلومات والنصائح حول التأثير التشغيلي المحتمل. بالطبع كل ذلك بموجب إخلاء المسؤولية أنه "يعتمد" حقاً على الموقف الذي يوجد فيه مشروعك.

التأثير التشغيلي المحتمل على المشروع / المهمة والخدمات الصحية المحيطة:

لفهم التأثير ، يمكنك جدول عمليات إعادة تقييم فيروس نقص المناعة البشرية / السل المنتظمة للمشروع ومنطقة التجمع المحيطة (وعلى مستوى الدولة إذا لزم الأمر). من المرجح أن تتم إعادة التقييم هذه إذا تم التخطيط لها بالفعل (على سبيل المثال) في العام المقبل. تولد إعادة التقييم نظرة ثاقبة حول مدى تغير موارد المشروع وما إذا كان هناك تأثير على مقدمي الخدمات الآخرين في منطقة مستجمعات المياه. يمكن أن تؤدي هذه الرؤية إلى تعديلات وتغذية معلومات محدثة في استراتيجية الخروج وتوسيع نطاق (أو خفض) القرارات. يمكن إعادة استخدام نماذج التقييم الأولي (انظر الملحق 1) بحيث تكون المعلومات من إعادة التقييم قابلة للمقارنة مع التقييمات السابقة.

عوامل التأثير المحتملة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار:

- زيارات الدعم الميداني. في بداية المكون الجديد أو حتى قبله ، يمكن توقع / طلب زيارات ميدانية من متخصصي فيروس نقص المناعة البشرية / السل. تتمتع جميع الأقسام بإمكانية الوصول إلى دعم التنفيذ للمساعدة في إعداد المكون الجديد لزيارات ميدانية أطول أو متكررة.
- ستكون هناك حاجة إلى مفاوضات إضافية ، ربما تكون حساسة ، على المستوى المحلي و / أو القطري (على سبيل المثال ، إخراج أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل في مذكرة التفاهم). يمكن أن تستغرق هذه المفاوضات وقتاً لإعدادها وسيتم إجراءها بعناية من قبل عضو فريق متمرس. غالباً ما يكون هناك العديد من الأطراف للمناقشة معها ؛ بالطبع وزارة الصحة والمجتمع المحلي ، ولكن فكر أيضاً في الممولين العالميين والمبادرات الشعبية المحلية ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين ؛ غير الحكومية ، والقطاع الخاص ، إلى آخره
- تأثير الوقت. أحد الشواغل التشغيلية المهمة هو ما إذا كانت إضافة اختصاص فيروس نقص المناعة البشرية / السل ستؤدي إلى التزامات زمنية يمكن أن تغير الجدول الزمني الأصلي المقصود للمشروع. يمكن أن يساعد وضع استراتيجية خروج مناسبة (بما في ذلك الارتباط بالبرامج الحالية وزيادة قدراتها مثل وزارة الصحة ووكالات التمويل المستدام مثل GF) منذ البداية على تبديد هذا القلق.
- ما هي الزيادات المحتملة في المورد؟ في المورد البشرية واللوجستيات والتمويل؟ سنحاول سرد عناصر "التأثير الكبير" أدناه ، لدعم تقدير للوضع / المشروع / المهمة التي أنت فيها.
- التبادل. غالباً ما يكون هناك أكثر من قسم واحد لمنظمة أطباء بلا حدود في بلد ما ، وبالتالي فهي فرصة تشغيلية لمشكلة الموارد والمعرفة.

الموارد البشرية

لتنفيذ أي نشاط جديد ، ستحتاج إلى الموارد البشرية للقيام بذلك. تشير الجداول الموجودة في المستند إلى نوع الموارد البشرية المطلوبة لكل نشاط مكون محدد. يرجى ملاحظة أنه ليس كل نشاط يحتاج إلى موظف "جديد": يمكن الجمع بين أنشطة مختلفة وتنفيذها بواسطة موظف واحد ، أو يمكن للموظفين الذين يعملون بالفعل في المشروع القيام بواحد أو أكثر من الأنشطة (احرص على تجنبها) على الرغم من زيادة العمل). استخدم الفرص المتاحة بالفعل في المشروع.

تشمل هذه الفرص أيضاً تحويل المهام والعمل مع العمال غير المتخصصين ، مثل المستشارين الأقران والسفراء / الأقران / المرضى الخبراء.

يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوظائف المختلفة عند تشكيل فريق متكامل يعمل على موضوع فيروس نقص المناعة البشرية / السل:

طبيب: يمكن لطبيب مدرب أن يعمل كمستشار فني للمشروع (حسب الخبرة) ، لدعم الحالات المعقدة.
مسؤول الطب السريري / المساعد الطبي / الممرضة: كان التدريب وتحويل المهام عاملاً أساسياً في توسيع نطاق مكونات فيروس نقص المناعة البشرية / السل. لم تعد إدارة فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل نشاطاً عالي التخصص ، حيث يمكن تنفيذ معظم الأنشطة السريرية الأساسية بواسطة طاقم طبي آخر.

القابلات: يمكن تدريب القابلات على إدراج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في خدماتهن ، مع توفر الطاقم الطبي الآخر للمساعدة إذا لزم الأمر.

الاستشاري: يمكن إجراء تثقيف وإرشاد للمرضى - بعد التدريب - من قبل أي رعاية صحية أو عاملين عاديين أو مربين أقران.

العاملون في الصحة المجتمعية (CHWs): يمكنهم دعم / تنفيذ أنشطة HP / CE.

المربون الأقران / المستشارون / الداعمون: غالباً ما يتم قبول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و / أو السل بشكل أفضل من قبل أقرانهم ويمكنهم العمل كمستشارين غير متخصصين أو دعم / تنفيذ أنشطة HP / CE.

فنيو المختبرات: اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والسل في البيئات المخبرية.

لا تنسى: الموارد البشرية: توصيفات وظيفية وإيجزات واضحة وإذا لزم الأمر مخطط تنظيمي لإظهار مستوى المسؤوليات والمسؤوليات والعلاقات بين المناصب المختلفة.

يعتمد عدد الأشخاص (الإضافيين) اللازمين لتشغيل برنامج صحي متكامل (بالطبع) على الوضع المحلي والقدرات ومستويات التعليم وحجم المكون ومرحلة الطور التي يمر بها المشروع. وهذا يجعل من الصعب تحديد الأرقام ، ولكن لإعطاء إشارة إلى ما هو مطلوب ، يفرق الجدول أدناه بين المكونات وحجم المرضى المتوقعين.

هذا بالتأكيد ليس إلزامي! إنها محاولة لإعطاء نظرة عامة عن وظائف الموارد البشرية لأخذها في الاعتبار أثناء تصميم مشروع التكامل الخاص بك.

كما هو الحال دائماً ، يرجى استشارة المنسقين والمراجع لديك.

لاحظ أيضًا أن التقدير أدناه ينظر بشكل أساسي إلى الطاقم الطبي. إذا كان عبء العمل على سبيل المثال زيادة الخدمات اللوجستية أو الصيدلانية ، يجب على هذه الأقسام بالتأكيد مراجعة قدراتها واحتياجاتها.

0-100 مريض في المجموعة / المكون (فيروس نقص المناعة البشرية أو السل أو كليهما):

إذا قام كل مريض بزيارة واحدة في الشهر في المتوسط وكان الشهر 20 يوم عمل: 0-5 مرضى في العيادات الخارجية يوميًا. بمجرد استقرار المرضى ، يمكنهم القدوم لإعادة التعبئة مرة كل 3 إلى 6 أشهر. سيكون التوقيت الإرشادي لاستشارات العيادات الخارجية 20 دقيقة لمريض جديد ، و 10-20 دقيقة لجلسة استشارية و 3-5 دقائق لاستشارات المريض بدون أعراض. يعتمد عدد اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية / السل على ما إذا كان المشروع ينفذ PICT أو VCT. من الناحية النظرية ، على سبيل المثال الانتشار هو 1% ، وهذا يعني أن ما يصل إلى 5000 شخص سيحتاجون إلى اختبار لتشخيص 50 مريضًا ، ولكن نظرًا لأن PICT يستهدف المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالسل أو فيروس نقص المناعة البشرية ، فإن هذا العدد سيكون أقل بكثير.

يحتاج كل مكون يتم اختياره في البرنامج المتكامل إلى موظف ، ولكن ليس بدوام كامل إذا كان عبء العمل منخفضًا. يرجى أن تضع في اعتبك أن موظفًا إضافيًا سيحتاج إلى التدريب لشغل الشاغر أثناء العطلات أو العمل بنظام الورديات -> لذلك تم ذكر "شخص إلى شخصين" في الجدول.

يمكن ضم بعض المكونات تحت شخص واحد ، على سبيل المثال يمكن لموظفي العلاج أيضًا الاهتمام بأنشطة الرصد والتقييم بينما يكون عدد المرضى منخفضًا. أو يمكن للمستشار أن يعتني بتثقيف المرضى وتقديم المشورة لهم واكتشاف الحالات واختبرها و HPCE. وهناك خيارات لتجنيد متطوعين أو مستشارين أقران للمساعدة في المكون.

يمكن للاختيار بين البرنامج الرأسي المتكامل أو المتواضع تأثير كبير. في حالة التكامل فأن العديد من الموظفين الذين يعملون بالفعل في المرفق الصحي يتولون مهام رعاية مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسل.

يمكن لبرنامج عمودي محدود على سبيل المثال برنامج يتضمن 1 إلى 2 ممرض / مسؤول عيادي ومستشار متفوغ ، مع دعم طبي من طبيب (سواء محلي أو عن بعد) العمل على تقديم المشورة بشأن مرضى IPD.

100-500 مريض في مجموعة / مكون ، 10-15 مريضًا جديدًا شهريًا (فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السل أو كليهما): إذا قام كل مريض بالزيارة مرة واحدة شهريًا في المتوسط وكان الشهر 20 يوم عمل: 5 - 25 مريضًا يوميًا في العيادات الخارجية. مرة أخرى ، بمجرد استقرار المرضى (يمكن أن تصل النسبة إلى 50٪) ، يمكنهم القدوم مرة كل 3 إلى 6 أشهر ، مما يقلل من عدد الاستشارات. غالبًا ما يرتبط عدد المرضى الذين يجب قبولهم في IPD بعدد حالات الإدخال الجديدة في المكون (على سبيل المثال 5 حالات IPD حيث يوجد 50 حالة قبول جديدة شهريًا). بمجرد أن يستقر المرضى على العلاج ، نادرًا ما يتم إدخالهم إلى المشفى.

في برنامج متنامي نحو 500 مريض ، تصبح الأنشطة أكثر "ملء يوم العمل" وسيتعين تمكين شخص أو شخصين المخصصين للمكون من استخدام المزيد في كل وقت عملهم لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسل . هذا يعني إما تحريرهم من المهام الأخرى أو تعيين المزيد من الموظفين لكل منهم للقيام بجزء منه.

< 500 مريض في المجموعة / المكون (فيروس نقص المناعة البشرية أو السل أو كليهما): إذا نما البرنامج ليشمل أكثر من 500 مريض ، فسيحتاج المزيد من الموظفين إلى التفويض الكامل لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل. يتطلب المكون موظفين مخصصين (استشاري / ممرضة ومستشار) لإدارة كل دفعة والنتائج المتعلقة بها ، بما في ذلك إدارة وتنسيق أنشطة DSD.

مع هذه الأعداد الكبيرة ، من المحتمل أن يتم الاختبار من خلال الاختبار الطوعي وستكون هناك حاجة إلى الموظفين لإجراء الاستشارة والاختبار على أساس يومي. أيضًا لن تكون المكونات الأخرى قابلة للإدارة إذا ظلت متصلة ، مثل M&E و HPCE.

مرة أخرى ، الأرقام الواردة في الجدول مجرد مؤشرات!

المكون	مريض 0 - 100	مريض 100 - 500	مريض > 500
العلاج (IPD)	الدعم MD	الدعم MD	دوام كامل MD
العلاج (OPD)	1-2 RN/CO دوام جزئي	1-2 RN/CO دوام جزئي الى دوام كامل	دوام كامل > 2 RN/CO
M&E			موظف البيانات 1 - 2
PMTCT	قابلة مدربة 1-2	قابلة مدربة 1-2	قابلة مدربة > 2
الوقاية			موظف وقاية متخصص
اكتشاف الحالة واختبارها	المستشارين 1-2 بدوام جزئي إلى بدوام كامل	المستشارين 1-2 بدوام جزئي إلى بدوام كامل VCT إذا لزم الأمر ، افضل) (والالتزام	موظفين > 2 VCT
تثقيف المريض وتقديم المشورة	فكر أيضًا في مستشاري الأقران)		المستشارين > 2
HP&CE		1-2 موظفي HP&CE بدوام جزئي إلى بدوام كامل	موظفي > 2 HP&CE
المخبر	فني المختبرات المدربين 1 - 2 أو الإحالة	فني المختبرات المدربين 1 - 2 أو الإحالة	فنيو المختبر متخصصون > 2 للمكون

أمثلة (قسم العلاج) من المشاريع القائمة:

جمهورية الكونغو الديمقراطية: الفوج 500 و 15 قبولاً جديداً شهرياً 2 -> ممرضة استشارية ومشرف واحد.
زيمبابوي: 15-20 قبولاً جديداً شهرياً ومجموعة 1000 -> ممرضتان.
جمهورية إفريقيا الوسطى: 450 مريضاً و 5-10 حالات قبول شهرياً -> ممرضة استشارية أو مساعدة ممرضة مدربة.

التدريب

يجب تدريب الطاقم الطبي حسب مستوى الرعاية. تتوفر مجموعة متنوعة من الدعم التدريبي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل في منظمة أطباء بلا حدود. على سبيل المثال التدريب الذي يمكن الحصول عليه من خلال جامعة أطباء بلا حدود SAMU، بما في ذلك:

- التعلم الإلكتروني عن فيروس نقص المناعة البشرية / السل للمستوى الأساسي ، متاح عبر الإنترنت.
- يتم تقديم التدريب السريري لفيروس نقص المناعة البشرية / السل في الموقع (عند الطلب) ويوجد التدريب المتقدم في كيب تاون.
- التدريب البرنامجي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل لمديري البرامج ؛ يتضمن التكامل البرنامجي.
- DR TB تدريب (متاح فقط في كيب تاون)

يمكن الحصول على دعم تنفيذ إضافي في الموقع من خلال مسؤول تنفيذ متنقل (MIO) يتم تقديم الدعم الفني المستمر بانتظام من خلال قسم فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل المرجعي.

برامج التدريب داخل الدولة: هناك دورات تدريبية داخل الدولة تنظمها منظمة أطباء بلا حدود ووزارة الصحة و / أو أصحاب المصلحة الآخرين ، بما في ذلك التدريب على المبادئ التوجيهية الوطنية وأدوات الرصد والتقييم (جمع البيانات) في مجال فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، إلخ.

العرض: أدوات الطلب والجدول الزمني

قد يتطلب طلب الأدوية اللازمة لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل بعض الدعم / الخبرة ، خاصة في البداية. أولاً ، من المهم مراعاة أن أنظمة العلاج يمكن أن تعتمد على السياسات الوطنية. يرجى مناقشة الأمر مع مستشار فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل الخاص بك. ثانيًا ، يجب حساب عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية بطريقة مختلفة عن الأوامر العادية. سيحتاج الأمر إلى أن يأخذ في الاعتبار المرضى الحاليين ، والعدد المقدر للمرضى الجدد ، والمخزون الاحتياطي. المبلغ الذي يتوجب طلبه بشكل تراكمي. للمساعدة في إصدار الأمر ، توجد أداة حسابية للعقاقير في حالة فيروس نقص المناعة البشرية في الملحق 2. تعد الاختبارات والأدوية الخاصة بالعدوى الانتهازية جزءًا من حسابات الترتيب المنتظمة. هذا مثل الحالات المزمنة الأخرى.

يمكن استخدام عقاقير الصندوق العالمي (GF) أو وزارة الصحة إذا كانت متوفرة ، ولكن ضع في اعتبارك بدء التركيبة بأدوية منظمة أطباء بلا حدود لأن الانتقال إلى نظام الأدوية والمشتريات في GF قد يستغرق بعض الوقت. يمكن أن تساعد أدوات طلب الأدوية الواردة في الملحق 2 أيضًا في تقدير / طلب الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من وزارة الصحة / الإدارة العامة. بمجرد أن يصبح من الممكن الحصول على مضادات الفيروسات القهقرية من خلال GF / وزارة الصحة ، من المهم الاستمرار في شراء الإمدادات الاحتياطية من خلال نظام أطباء بلا حدود لمنع انقطاع أونفاد المخزون ، بما في ذلك الاختبارات والأدوية الخاصة بـ OIS. يمكن أن يساعدك الصيدلي العامل معك في نفس القسم إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بجودة الأدوية (على سبيل المثال ، إذا تم توفيرها من خلال نظام التمويل المشترك).

كما هو الحال مع أي طلبات ، يرجى مراعاة المهل الزمنية! سيستغرق وصول الطلب الأول إلى مستوى المشروع وقتًا ، كما أن الطلبات الجديدة في الوقت المناسب مهمة لضمان عدم انقطاع أي شخص عن العقاقير العلاج الخاصة به. لبدء تشغيل أحد المكونات (خاصة في حالات الطوارئ) ، قد يكون من المفيد النظر في مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية / السل المتوفرة عبر إمدادات منظمة أطباء بلا حدود ومجموعة الطوارئ الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / السل لـ 50 مريضًا - انظر الملحق 3.

التمويل: التكاليف وآليات التمويل الوطنية

تعتمد الاحتياجات المالية الدقيقة بشكل كبير على الظروف (مثل الموقع ورواتب الموظفين وتوافر الأدوية والمواد والتكاليف ، إلخ). قد يكون من المفيد ، ولكن المقصود فقط كمثال ، يقدم الملحق 6 ميزانية تقديرية لكل مريض لمشروع الاختبار والعلاج في يامببو (جنوب السودان).

يمكن أن تتأثر التكاليف الإضافية لعنصر تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / السل بعدة عوامل:

- تكاليف أدوية فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. يجب طلب الأدوية الإضافية (بما في ذلك أدوية IOI) وإدراجها في الميزانية. لحسن الحظ ، انخفض سعر عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية والسل بشكل كبير خلال السنوات الماضية ، بعد الكثير من الجهود من قبل العديد من الجهات الفاعلة (بما في ذلك حملة منظمة أطباء بلا حدود ، ومبادرة كليتوتون الخيرية لمكافحة الإيدز ، إلخ ..)
- تكاليف الفحوصات والآلات المخبرية. ملاحظة يجب وضعها في الاعتبار أن آلات المختبر يمكن أن تكون باهظة الثمن عند الشراء الأولي ، خاصة إذا كان معمل المشروع بحاجة إلى تعديل ، على سبيل المثال يمكن أن تتطلب Xpert مكيف هواء.
- التمويل الدولي. تحصل معظم البلدان على تمويل مخصص من مصادر دولية مثل الصندوق العالمي (GF) و PEPFAR لبرامجها الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية (ملاحظة: يعاني المانحون والممولين العالميين من انخفاض في الأموال). عادة ما يتم تمويل برامج مكافحة السل جزئيًا من قبل حكومات الدول. لا تستخدم منظمة أطباء بلا حدود التمويل المباشر من GF أو PEPFAR ، ولكن من الممكن استخدام السلع المقدمة مثل مضادات الفيروسات و المواد الكيميائية للمختبر (انظر العرض). قد يعتمد التمويل المحدد في المشريع على عدة عوامل.
- في حالة عدم وجود وزارة الصحة ، يمكن أن تكون منظمة أطباء بلا حدود هي المصدر الوحيد للتمويل. قد يتغير هذا بمرور الوقت بسبب استمرار أعمال المنصرة ، وجذب جهات فاعلة أخرى ، بما في ذلك وزارة الصحة ، والموازنة العامة ، إلخ.
- في حالة وجود برنامج قائم (وزارة الصحة والجهات الفاعلة الأخرى وما إلى ذلك) ، اعتمادًا على نتائج التقييم ، يمكن مشكلة تمويل خدمات فيروس نقص المناعة البشرية / السل بين منظمة أطباء بلا حدود وأصحاب المصلحة الآخرين ، وخاصة وزارة الصحة والموازنة العامة. على سبيل المثال ، يمكن أن توفر وزارة الصحة البنية التحتية للموظفين والعيادات وجميع الأدوية التي يتم شراؤها من خلال GF بينما يمكن لمنظمة أطباء بلا حدود دعم النقل.

استراتيجية الخروج

قد يكون من الصعب التفكير في استراتيجية خروج قبل أن تبدأ في تنفيذ مكون فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. ومع ذلك ، فإن التجارب السابقة تحثنا على أن نضع في اعتبارنا كيف يمكن أن يستمر المكون بعد عدم وجود منظمة أطباء بلا حدود ، أثناء إعداده وطوال مدة المشروع.

ملحوظة: عدم رؤية أي احتمال لخروج مناسب يجب ألا يكون السبب الوحيد لعدم البدء حتى. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمشروعك ، يرجى مناقشة المنسقين والمستشار الخاص بموضوع فيروس نقص المناعة البشرية / السل.

لمزيد من المعلومات الكاملة حول استراتيجيات الخروج ، يرجى الاطلاع على وثيقة منظمة أطباء بلا حدود "إجراء خروج" (MSF UK 2011) ⁶ بشكل عام ، يوصى ببدء التفكير على المدى الطويل (بما في ذلك استراتيجية الخروج) بمجرد أن يغادر المشروع مرحلة الطوارئ الحادة وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الجهات الفاعلة الأخرى من البداية.

الاعتبارات الرئيسية عند التخطيط للخروج / التسليم لأنشطة منظمة أطباء بلا حدود الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / السل هي:

- ضمان استمرارية الخدمات. تحديد شركاء التسليم المحتملين للمستقبل (من الناحية المثالية وزارة الصحة) وتقييم ما إذا كانوا قد ضمنوا آليات لتوفير الإمداد المستمر بمضادات الفيروسات العكوسة وأدوية السل. الشيء نفسه بالنسبة لتوافر الموظفين الرئيسيين لتشغيل المكون (الحد الأدنى من الممرضة / المستشار).
- تحضير البيئة المحيطة. عند التفكير في استراتيجية الخروج ، امنح وقتًا كافيًا لتخطيط وتنفيذ التسليم. النظر في نهج مرحلي في تسليم المكونات.
- التواصل. ابدأ اتصالات كافية وواضحة ومتسقة مع جميع أصحاب المصلحة في الوقت المحدد. وهذا يشمل الموظفين والمرضى والجهات الفاعلة الأخرى والمجتمع. يمكن دعم التفاوض بشأن إستراتيجية التسليم مع شريك (شركاء) التسليم من خلال على سبيل المثال لوحة معلومات ذات أهداف متفق عليها وجدول زمنية واضحة وعملية المراقبة.
- جودة الرعاية. في حالة الانتقال من مستوى مرتفع من الموارد / التكاليف إلى مستوى منخفض من الموارد / التكاليف ، فمن المرجح أن تنخفض جودة الرعاية. يجب أن يدعم تحديد المستوى الأمثل لجودة الرعاية والتخطيط في الوقت المناسب لعملية التسليم مع أهداف النتائج المتفق عليها الاحتفاظ بمستوى مقبول من الرعاية.

⁶ <http://evaluation.msf.org/project-handovers>

تكييف خدمات فيروس العوز المناعي البشري / السل المتكاملة القائمة

حتى الآن ، كان الافتراض أن مكون التكامل يجب أن يبدأ من الصفر. ولكن هناك أيضًا مشاريع تحتوي بالفعل على مكونات لفيروس نقص المناعة البشرية والسل مدمجة في خدماتها.

قد ترغب هذه المشاريع في تكييف خدماتها ، لكن ... متى يكون الوقت مناسبًا وما هي الأسباب الصحيحة للتكيف؟ ما هي العوائق الرئيسية التي قد تواجهها؟

يجب أن تساعد إعادة تقييم الموقف في الإجابة على معظم هذه الأسئلة. يمكن أن تساعد أدوات التقييم الواردة في الملحق 1 هنا أيضًا. على سبيل المثال هل تغيرت سياسات فيروس نقص المناعة البشرية / السل أو وضع التمويل الدولي؟ هل هناك جهات فاعلة جديدة لديها عنصر فيروس نقص المناعة البشرية / السل وما هي جودة رعايتهم؟ من هم المرضى ، هل هناك إمكانية للتمييز بين الرعاية بطريقة أكثر فعالية؟ ما هي السعة داخل المشروع ، هل هناك مجال للنمو؟ إلى آخره.

بالطبع ، من الجيد إشراك مرجع فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل الخاص بك للحصول على المشورة بشأن التوسع (بما في ذلك أفضل الأدوات المتاحة لاستخدامها من أجل تبسيط الرعاية ، مثل اختبار الحمل الفيروسي واللا مركزية و DSDs مثل CAGs).

من الجيد أيضًا أن تضع في اعتباك أن التوسع لا يعني دائمًا المزيد من العمل. على سبيل المثال ، يمكن أن يعني إجراء اختبار الحمل الفيروسي على جهاز Xpert أن المرضى المستقرين يمكنهم تقليل عدد الفحوصات في الطب السريري بأمان ، لأن الحمل الفيروسي الخاص بهم لا يمكن اكتشافه ، ويمكنهم الانضمام إلى نموذج DSD.

إطار السجل والحد الأدنى من المؤشرات القياسية

لتجميع كل ذلك معًا ، ستحتاج إلى تعديل إطار سجل المشروع ليشمل الآن أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. أضف أهدافًا محددة بمؤشرات يمكن التحقق منها (تتصل بسهولة بنظام الرصد والتقييم). هناك العديد من المؤشرات الممكنة ، اعتمادًا بالطبع على الأنشطة المراد دمجها. فيما يلي الحد الأدنى من المؤشرات القياسية التي يمكن استخدامها في إطار السجل. يرجى مناقشة الأمر مع المرجع الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل إذا كان قسمك يحتوي على متطلبات محددة لإطار السجل ، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمؤشرات وصياغة أهداف محددة.

الحد الأدنى من المؤشرات القياسية لفيروس نقص المناعة (لفترة محددة)	الحد الأدنى من المؤشرات القياسية لمرض السل (لفترة محددة)
<p>استخدام الخدمات</p> <ul style="list-style-type: none"> عدد تم اختباره HIV + % & عدد on ART % & عدد <p>النتائج الدورية</p> <ul style="list-style-type: none"> LFU) فقد للمتابعة % & عدد وفيات % & عدد ماتزال في العناية % & عدد <p>PMTCT</p> <ul style="list-style-type: none"> HIV+ النساء حوامل تم اختبارهم % & عدد في البرنامج في نهاية 24 شهرًا HIV + الأطفال % & عدد العبيء أو الحمل الفيروسي قمع الفيروس % & عدد مع قابل للاكتشاف % & عدد VL > 1000 ART في الخط الثاني % & عدد 	<p>استخدام الخدمات</p> <ul style="list-style-type: none"> عدد اختبار السل DSTB تم تأكيد حالات جديدة % & عدد لمكافحة السل DSTB بدأت حالات جديدة % & عدد حالات RR/MDR % & عدد بدأ العلاج RR/MDR % & عدد <p>HIV/TB</p> <ul style="list-style-type: none"> HIV + % & عدد on ART % & عدد <p>نتائج نهاية العلاج</p> <ul style="list-style-type: none"> تم علاجها بنجاح % & عدد حالات فشل % & عدد LFU) فقد للمتابعة % & عدد وفيات % & عدد <p>العلاج الوقائي من السل</p> <ul style="list-style-type: none"> أكمل العلاج الوقائي من مرض السل <5s % & عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أكملوا الوقاية من % & عدد السل

الجزء الثالث: الحالات الخاصة

علاج فيروس نقص المناعة البشرية / السل وحالات الطوارئ

تأثر 2.5 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بحالات الطوارئ الإنسانية على مستوى العالم في عام 2016 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (زيادة من 1.67 مليون في عام 2013) مع حدوث أكبر زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء (1.2 إلى 1.7 مليون). كما زادت فجوة العلاج أيضاً من مليون في عام 2013 إلى 1.25 مليون في عام 2016.

في عام 2006 ، توصلت منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز واليونيسيف ومنظمة أطباء بلا حدود إلى توافق في الآراء يقول إن تقديم العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة في حالات الطوارئ أمر ممكن ويمثل التزاماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان واستراتيجية الصحة العامة.

يجب إدراج احتياجات هؤلاء السكان في الاستجابة للطوارئ عند انقطاعهم عن الخدمات الصحية الأصلية. تم إحراز تقدم حتى الآن مع إقرار برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بالمشكلة وإطلاق فريق العمل المشترك بين الوكالات (IATT) في عام 2011 للعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الأخرى لمعالجة أمور من بينها دعم تطوير السياسات والبرامج وتعبئة الموارد المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والتخطيط الاستراتيجي.

التخطيط للطوارئ

في الأماكن التي يحدث فيها عدم استقرار أو حالة طوارئ حادة وتكون مكونات فيروس نقص المناعة البشرية / السل تعمل بالفعل ، يجب أن تضمن منظمة أطباء بلا حدود استمرار أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل في العمل دون انقطاع. سيؤدي الانقطاع المتكرر لإمداد الأدوية إلى الإضرار بالنتائج الصحية للمرضى الخاضعين لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / السل ويمكن أن يتسبب في تطوير أو تضخيم مقاومة مضادات الفيروسات القهقرية و / أو الأدوية المضادة للسل.

تهدف خطة الطوارئ (CP) إلى تجنب الانقطاعات في العلاج من خلال توفير مخزون إضافي من الأدوية (الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ، والأدوية المضادة للسل ، و CTX ، و NVP في حالات منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل) قبل أو أثناء عدم الاستقرار. للسماح بوقت كافٍ لتطبيع الخدمات أو للمرضى للوصول إلى الخدمات في مكان آخر.

هذا يتطلب التخطيط مسبقاً. تتضمن مرحلة التحضير (انظر الجدول أدناه) إعداد "أكياس الهروب" مع 3 إلى 6 أشهر من الأدوية وتثقيف المرضى حول ما يجب القيام به في حالة الحاجة إلى وضع خطة الطوارئ موضع التنفيذ. بمجرد أن تصبح هذه هي الحالة ، تبدأ مرحلة التفاعل ، ويتم توزيع الأكياس.

من الناحية المثالية ، يجب تحديد الإنتاج الأنظف قبل بدء الأنشطة (أو على الأقل قبل ظهور عدم الاستقرار) ، وكذلك تحديثه بانتظام وفقاً للسياق ووضع المشروع. يجب أن يعرف CP من قبل الأشخاص الرئيسيين في هذا المجال ، وكذلك من قبل المرضى.

يجب تنشيط الإنتاج الأنظف قبل أن يصل عدم الاستقرار / الطوارئ إلى النقطة التي تتوقف فيها الأنشطة العادية للمشروع ، بسبب إجماع الموظفين و / أو تقليل الأنشطة. يرتبط تصميم الإنتاج الأنظف وتنشيطه ارتباطاً جوهرياً بمستوى أمان المشروع ، وهو ما يتم تحديده عادةً من خلال التنسيق الميداني والبعثة

يجب أن تأخذ إمدادات الأدوية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود / الطلبات الدولية في الاعتبار تنفيذ الإنتاج لحالات الطوارئ ، حيث ستكون هناك حاجة إلى إمدادات أدوية إضافية بالإضافة إلى الإمداد العادي. يحتاج هذا إلى التخطيط مسبقاً بوقت كافٍ لأن نقص المخزون الكافي قد يؤثر على تنفيذ البرامج القطرية. أضف مخزون الطوارئ المتوقع وفقاً للمبلغ الذي سيتم توفيره وفقاً للمبادئ التوجيهية / الخطة للطوارئ.

⁷ Delivering antiretroviral drugs in emergencies: neglected but feasible, 20 September 2006, WHO.
https://www.who.int/hac/techguidance/pht/HIV_AIDS_101106_arvemergencies.pdf?ua=1

أهداف	مرحلة التحضير (قبل الطورئ / انقطاع الخدمات)	مرحلة التفاعل قبل حدوث الاضطراب عندما يحدث الاضطراب ، قد نتأخر في توزيع أكياس الأخلاء
ماذا	<p>خريطة مواقع المرضى. سجل لتدوين المرضى تحت CP. تحديد الأشخاص الرئيسيين في الطب السريري (NS) وعلى مستوى المجتمع.(PLWHIV / CHW) إبلاغ المرضى والحصول على موافقة العاملين الصحيين المجتمعين الذين يقومون بتوزيع أكياس الهروب. امنح جميع المرضى "جواز سفر فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل". تثقيف المرضى حول ما يجب القيام به. جهزوا "أكياس الهروب" من 3 إلى 6 أشهر من الإمداد بالأدوية. مخزون الطورئ في جميع المرافق الصحية: فحص المخزون وتناوبه وفقًا لتاريخ انتهاء الصلاحية ؛</p>	<p>وزع "حقائب الهروب" في الطب السريري أو من خلال شخص محوري في المجتمع. إرسال مخزون الطورئ إلى المرافق الصحية (إذا لم يتم ذلك من قبل). إذا كان ذلك ممكنًا ، استمر في الفحص / اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والإدراج الجديد في ANC ، والمرضى المشتبه بهم سريريًا (بما في ذلك الأطفال) وبرامج التغذية ؛</p>
أين	<p>في جميع المشاريع التي يتوقع فيها عدم الاستقرار حسب تحليل المخاطر على مستوى التنسيق على مستوى المشروع: وثيقة الإنتاج لحالات الطورئ موجودة على مستوى المنشأة الصحية على مستوى المجتمع</p>	<p>على مستوى المشروع على مستوى المنشأة الصحية على مستوى المجتمع</p>
لمن	<p>جميع المرضى في مكون فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل</p>	<p>يتأثر جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (PWTB) بعدم الاستقرار</p>
من	<p>للتنسيق بين جميع الوافدين: PMR / MTL والمغتربين مشرف موضوع فيروس نقص المناعة البشرية / السل: لضمان توعية الموظفين الوطنيين شركات الأدوية والصيدلة (مهمة ومشروع): لتجهيز المخزون</p>	<p>يتم تنشيط CP بواسطة FieldCo وتنسيقه بواسطة PMR أشخاص رئيسيين: الكادر الوطني: ممرضة ، مستشار مستوى المجتمع: الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو العاملين الصحيين المجتمعين</p>

تدخل طارئ جديد - بدون مشروع موجود مسبقاً

في تدخل طارئ جديد – بدون وجود مشروع مسبق لمنظمة أطباء بلا حدود - يجب إدراج تقييم أساسي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل في تقييم الطوارئ ورسم خرائط الوضع. يجب أن تتضمن أوامر الطوارئ أدوية السل ومضادات الفيروسات القهقرية. للمساعدة في الطلب الأول ، تم تطوير مجموعة أدوات الطوارئ لرعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل لـ 50 مريضاً كبدائية ، انظر الملحق 3.

التوصية الخاصة برعاية فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في المراحل المبكرة من التدخل الطارئ الجديد هي التركيز أولاً على التأكد من أن المرضى الذين كانوا يتلقون بالفعل أدوية فيروس نقص المناعة البشرية / السل يحصلون على عبوات جديدة يحتاجون إليها لتجنب الانقطاع. تشمل المكونات الأخرى للمرحلة المبكرة تدابير وقائية عالمية ، وضمان توفر PEP ، ونقل الدم الآمن ، والوقاي الذكري ، والتخطيط للطوارئ.

أهداف	الوقاية توقف العلاج / إعادة الشروع	الوقاية من انتقال المخاطر العالية
ماذا	استمرار ART / ATT : استشارات العيادات الخرجية / IPT ، نماذج DSD لتوزيع ART للمرضى المستقرين. العلاج المضاد للفيروسات القهقرية للمرضى الضعفاء (السل ، OI ، ITFC ، KA) إذا كان ذلك ممكناً. التخطيط للطوارئ. استشارات الالتزام: استشارات واختبار العيادات الخرجية / العيادات الخرجية ؛	PEP للموظفين العنف الجنسي والجنساني في SRH / OPD اختبار فيروس نقص المناعة البشرية للحوامل والمرضعات.
أين	أي مرافق مدعومة	أي مرافق مدعومة
لمن	المرضى الذين كانوا يتلقون بالفعل علاج فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض السل المرضى الضعفاء / المرضى للغاية الذين يحتاجون إلى العلاج	الموظفون في خطر الناجيات من العنف الجنسي
من	الوافدون بشكل رئيسي كادر وطني مدرب: طبيب ، ممرضة ، قابلة ، مستشار	الوافدون بشكل رئيسي كادر وطني مدرب: طبيب ، ممرضة ، قابلة ، مستشار

الطوارئ / عدم الاستقرار في مشروع موجود مسبقًا

في الحالات التي تحدث فيها حالة الطوارئ / عدم الاستقرار حيث يوجد بالفعل مشروع تابع لمنظمة أطباء بلا حدود مع عنصر فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل ، يجب أن تضمن منظمة أطباء بلا حدود استمرار أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل في العمل. تعتمد إمكانية استمرار الأنشطة على مستوى الاضطراب:

1. الاضطراب الكامل: بسبب انعدام الأمن الشديد ، قد يتم إجلاء الموظفين أو السبات ، مما يجبر المنشأة الصحية على الإغلاق. من الناحية المثالية ، تم إجراء الاستعداد للظروف لهذا السيناريو ويمكن تفعيل خطة الطوارئ في أقرب وقت ممكن
2. عندما يسمح الاضطراب للموظفين والمرضى (البعض) بالوصول إلى المرفق ، فقد تقتصر الخدمات على توفير إمدادات الطوارئ وإعادة تعبئة الأدوية في حالات الطوارئ للمرضى الحاليين لمنع الانقطاع وتقديم العلاج المنقذ للحياة.
3. قد يصبح الوضع بيئة انعدام أمن مؤقتة ، مما يسمح باستمرار الخدمات المحدودة أو المعدلة.
4. يعود الوضع تمامًا إلى طبيعته ، وتستأنف الأنشطة الكاملة.

في مثل هذه الحالات ، يمكن التعامل مع خدمات مرض السل لفيروس نقص المناعة البشرية على مراحل اعتمادًا على مستوى الاضطراب / انعدام الأمن. فيما يلي بعض الأساليب المقترحة التي يجب اتباعها اعتمادًا على مستوى الاضطراب:

	المرحلة 1 st : اضطراب كامل	المرحلة 2 nd : تعطل (بعض) الوصول إلى المرفق	المرحلة 3 rd : انعدام الأمن المزمّن المنخفض المستوى
الأهداف	لا توجد أنشطة	الوقاية من انقطاع العلاج منع انتقال العدوى عالية الخطورة إعادة بدء العلاج بعد الانقطاع خطة طوارئ	تأكد من عدم انقطاع العلاج للجميع الذين يتعاطون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية والسل العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية للمرضى الضعفاء خطة طوارئ
ماذا	لا توجد أنشطة	استمرار العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والسل خطة طوارئ العنف الجنسي والجسدي PEP	أنشطة الوقاية اختبر وعالج تثقيف المريض / خدمات الاستشارة مراقبة المختبر (Xpert ، CD4) لإحالات TB / VL / EID أو (DBS) رصد وتقييم المشاركة المجتمعية ونماذج الرعاية المجتمعية
أين	مرفق لا يمكن الوصول إليه / مغلق	العيادات الخارجية ، (المرافق الصحية ، والسل / فيروس ANC ، و IPD و عيادة (نقص المناعة البشرية	جميع المرافق و المجتمع HP ؛ ، DSD ، جهة الاتصال + فقدت لمتابعة التتبع
لمن	لا يوجد مرضى	الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية و متطوعو الرعاية الصحية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي ، النساء الحوامل / المرضعات المرتبطات بالصحة الجنسية والإنجابية	المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) و PWTB المرضى الضعفاء ، ITFC ، مرضى Kala Azar ، المرضى في OPD / IPD مع OIs ، النساء الحوامل في ANC والنساء المرضعات في PNC المرتبطين ب SRH.
من	لا يوجد موظفين	المهام المشتركة بين العمالة الوافدة / الوطنية	تم تحويل المهام إلى الموظفين الوطنيين الرئيسيين (طبيب ، ممرض ، مستشار ، صحة المجتمع)

السكان المتنقلون

هناك مواقف مختلفة يمكن أن تؤدي إلى تحركات السكان:

- الصراع والنزوح
- السكان البدو
- العمال المهاجرين

التحدي الذي يواجه الأشخاص المتنقلين للحصول على رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل هو أنك لا تعرف متى وحتى إذا كنت ستقابلهم مرة أخرى في عيادتك. ومع ذلك ، لا يجب أن يكون هذا سبباً لعدم تنفيذ رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل. يوصى بالخطوات التالية لمحاولة إبقاء المرضى على علاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل آمناً قدر الإمكان:

1. ضع خريطة لجميع المرافق التي تقدم رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في المنطقة
2. رسم خريطة لتحركات السكان في حالة البدو أو العمال المهاجرين (الدورات ، التوقيت)
3. إعطاء بطاقة جواز سفر فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل لجميع المرضى
4. سجل جميع السكان المتنقلين بما في ذلك الاتصال الهاتفي وتأكد من الاتصال الهاتفي 3-6 شهرياً إن أمكن
5. تعليم قوي للمريض وأفراد الأسرة
6. ضمان مراقبة الحمل الفيروسي سنوياً

دمج فيروس نقص المناعة البشرية / السل في السكان المتنقلين	
الهدف	الوقاية من انقطاع العلاج
ماذا	استمرار العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (6 أشهر أو أكثر حسب الحركات) استمرار ATT (دورة كاملة) PSEC
كيف	<ol style="list-style-type: none"> 1. ضع خريطة لجميع المرافق التي تقدم رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في المنطقة 2. ضع خريطة لتحركات السكان في حالة البدو (الدورات ، التوقيت). 3. إعطاء بطاقة جواز سفر فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل لجميع المرضى 4. سجل جميع السكان المتنقلين بما في ذلك الاتصال الهاتفي وتأكد من الاتصال الهاتفي 3-6 شهرياً 5. ضمان التثقيف الصحي الكافي والمعلومات اللازمة للمريض وأفراد الأسرة عند كل جهة اتصال ، تثقيف بشأن أهمية مراقبة الحمل الفيروسي سنوياً
أين	منشأة طبية للعناية بحالات فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل
من	كادر وطني مدرب: طبيب ، ممرضة ، قابلة ، مستشار

أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل

يلخص هذا الفصل المكونات وخيارات النشاط المختلفة ضمن رعاية فيروس العوز المناعي البشري والسل. هناك عدد غير قليل من الخيارات بمستويات مختلفة من التعقيد. يمكن للمشروع أن يقرر أي المكونات / الخيارات ذات صلة ، مع الأخذ في الاعتبار تقييمهم لسياق فيروس نقص المناعة البشرية / السل ومرضاهم وقدرة المشروع. توفر الجداول أدناه نظرة عامة على المكونات والخيارات.

رعاية فيروس نقص المناعة البشرية

المكون	خيارات النشاط	PEP	PrEP	
وقاية	الواقي الذكري			
PMTCT	تحديد فيروس نقص المناعة البشرية + حامل	الوقاية	التشخيص المبكر للوضع	
اكتشاف الحالة واختبارها	PICT	VCT		
العلاج	علاج OI	إدخال شخص ART	المراقبة ART	إعادة تعينه ART
تثقيف المريض / الاستشارة	اختبار أولي	الاختبار اللاحق	الالتزام	
المجتمع المحلي	جهات الاتصال	تعزيز الصحة	اكتشاف الحالة ، المفقودة لمتابعة التعقب	مجموعات دعم المجتمع
المختبر	RDTs	(قريب) أدوات نقطة الرعاية	الأدوات في مخبر المشروع	الأدوات في مخبر الإحالة
M&E	جمع البيانات الورقية وإعداد التقارير		جمع البيانات الإلكترونية وإعداد التقارير	

رعاية مرض السل

المكون	خيارات النشاط	التدابير المحيطة	التدابير الشخصية	علاج السل الكامن
وقاية	الإجراءات الإدارية			
اكتشاف الحالة واختباره	إيجاد حالة سلبية	اكتشاف حالة نشطة		
العلاج	السل الحساس للأدوية	(متعدد) السل المقاوم للأدوية		
تثقيف المريض / الاستشارة	تثقيف المريض	استشارات الالتزام		
المجتمع المحلي	جهات الاتصال	تعزيز الصحة	اكتشاف الحالة ، المفقودة لمتابعة التعقب	مجموعات دعم المجتمع
المختبر	المجهر	(قريب) أدوات نقطة الرعاية	الأدوات في مخبر المشروع	الأدوات في مخبر الإحالة
M&E	جمع البيانات الورقية وإعداد التقارير		جمع البيانات الإلكترونية وإعداد التقارير	

تحتوي الصفحات التالية على أوصاف ملخصة لكل مكون وخيارات النشاط. سيعرض الجدول اللبنة الأساسية للأنشطة وسيوضح النص الموجود أسفل الجدول مستويات التعقيد للتنفيذ ، والتي تتراوح من الأساسي إلى الأكثر شمولاً. اللبنة الأساسية هي: ماذا / أين / لمن / متى ومن:

اللبنة الأساسية

ماذا	وصف النشاط
أين	الموقع داخل المنشأة الصحية أو خارجها حيث يمكن تسليم النشاط
لمن	السكان المستهدفون بالنشاط
متى	متى يجب تنفيذ النشاط ضمن سلسلة الرعاية أو عدد المرات التي ينبغي تنفيذها / القيام بها
من	من يمكن اعتباره مسؤولاً عن القيام بالنشاط

لمزيد من المعلومات التفصيلية (و / أو السريرية) حول كل خيار ، يرجى الرجوع إلى الإرشادات السريرية والبرامجية المذكورة في هذا المستند. كما يمكن العثور على روابطهم ومراجعهم في قائمة الموردين في الملحق 5.

للحصول على أمثلة لمكونات تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في التشريعات القائمة ، يرجى الاطلاع على بعض دراسات الحالة في الملحق 7.

تهدف الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / السل إلى الوقاية من إصابة الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية أو عدوى السل. إرشادات للإشارة إليها عند التنفيذ: المبادئ التوجيهية السريرية IPC و PSEC و HIV / TB الملحق (5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ تم دمج التدريبات في التدريبات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / السل - انظر قسم الموارد البشرية والتدريب في الجزء الثالث. توجد دورات تدريبية محددة في وات / سان لمكافحة عدوى السل. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، مواد الاحتياطات القياسية العامة ومواد الإمداد مثل الواقي الذكري وأجهزة التنفس N95 وعقاقير فيروس نقص المناعة البشرية أو السل (الأدوية الوقائية) .

ملاحظة عامة: بغض النظر عن تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، يجب أن يكون لدى جميع المشاريع (كحد أدنى) إجراءات وممارسات أساسية للوقاية من العدوى (IPC) في مكانها الصحيح. وهذا يشمل الاحتياطات القياسية (المعروفة سابقًا باسم الاحتياطات العامة) ، ونظافة اليدين ، ونقل الدم الآمن ، وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، وتوزيع الواقي الذكري ، و PEP للموظفين وضحايا العنف الجنسي. تفاصيل التدابير العامة للتصنيف الدولي ل IPC غير مدرجة في هذه الوثيقة. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى إرشادات IPC⁸

الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

	الوقاية قبل التعرض: PrEP	الوقاية بعد التعرض لل PEP:	الواقي الذكري
ماذا	الوقاية ART حزمة المراقبة	الأدوية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية	قم بتوفير الواقي الذكري
أين	منشأة صحية	منشأة صحية	منشأة صحية ، التوعية
لمن	مخاطر عالية للتعرض ، الأزواج المتخصصين	حوادث الإبر / التعرض المهني والناجين من العنف الجنسي والجسدي	كل الناس الذين يحتاجونهم
متى	أيام على الأقل قبل التعرض / بعد نتيجة 7 اختبار فيروس نقص المناعة البشرية السلبية	في غضون 72 ساعة بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية	جميع المرافق الصحية / التوعية
من	ممرضة ، مسؤول الطب السريري	ممرضة ، مسؤول الطب السريري	المستشارون والعمال العاديون / الأقربان ، إلخ* .

*أو اجعل الواقي الذكري متاحًا ومعروضًا في المنشأة.

فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ، فإن أحد الخيارات الأساسية هو تقديم الواقي الذكري. يعتبر العلاج الوقائي بعد التعرض جزءًا من الوقاية⁹ الأساسية ويجب تطبيقه في أي مشروع. الوقاية قبل التعرض ، على سبيل المثال بالنسبة للأزواج المتخصصين أو الأشخاص المعرضين لخطر التعرض العالي ، يتطلب المشورة والمراقبة المستمرة. تذكر أيضًا أن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) يعمل كوقاية¹⁰ في المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين لا يمكن اكتشافهم فيروسيًا ، يكون فيروس نقص المناعة البشرية غير قابل للانتقال.

⁸ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251730/9789241549929-eng.pdf;jsessionid=AA7FD1D166B9ABA4EDFE21F9A345A811?sequence=1>

⁹ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277395/WHO-CDS-HIV-18.51-eng.pdf?ua=1>

¹⁰ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186275/9789241509565_eng.pdf?sequence=1

منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل: PMTCT

تهدف أنشطة منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

إرشادات للرجوع إليها عند التنفيذ: إرشادات منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل (الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ التدريب على الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل مدمج في التدريب الأساسي على الإنترنت لفيروس نقص المناعة البشرية وفي تدريب الصحة الجنسية والإنجابية (للقابلات). هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ ART للأم والطفل المكشوف ، مواد معملية لـ PCR DNA ، مواد تعليمية مثل اللوحات الورقية ؛ بروتوكول منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل للموظفين

منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل: الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل هي الطريقة الأكثر أهمية وفعالية لمنع الأطفال حديثي الولادة من الحصول على عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من أمهاتهم. توضح الجداول أدناه ما هو مطلوب لإعداد منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. عادة ما تكون الخدمة متصلة بعيادة الرعاية الصحية الأولية وخدمات الولادة وتربط الأم والطفل بمكون فيروس نقص المناعة البشرية السائد وخدمات الطب السريري الأقل من 5 سنوات. من وجهة النظر اليرامجية ، قمنا هنا بتقسيم الخدمات (1) المخصصة لتحديد الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وعلاجهن وتدابير وقائية للأطفال و (2) مخصصة للتعرف المبكر على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة للانتقال الرأسي لبدء العلاج.

الأهداف PMTCT (1)	تحديد فيروس نقص المناعة البشرية + النساء الحوامل	الوقاية أثناء الحمل	الوقاية أثناء الولادة		الوقاية أثناء BF الأم و الطفل
			الأم	الطفل	
ماذا	HCT	بدء ART تثقيف المريض ART إعادة تعبئه	استمرار ART	توكيبة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية وفقاً لإرشادات منظمة أطباء بلا حدود / وزلة الصحة	ART أو ART نظام وقائي ثلاثي للطفل ، تثقيف المريض HCT للنساء لم يتم اختبارهن من قبل النظر في HCT للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية
أين	الأمومة, ANC	عناية ANC	الأمومة	الأمومة	رعاية ما بعد الولادة (برنامج التطعيم) EPI (إن وجد) U5 برنامج
لمن	جميع النساء الحوامل	فيروس نقص المناعة البشرية + النساء الحوامل	فيروس نقص المناعة البشرية + النساء الحوامل	الأطفال المولودين من نساء + فيروس نقص المناعة البشرية	الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال المولودين من أمهات مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
أين	ANC الزيارة الأولى. منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل إذا لم يتم اختباره.	في ANC: البدء لأسرع وقت ممكن بعد التشخيص إعادة العتبة: شهرياً	عند الولادة	بعد الولادة مبلثرة	منذ الولادة: 6 أسابيع لخطورة منخفضة و 12 أسبوعاً لخطورة عالية
من	قابلة / مستشارون	قابلة / مستشارون	قابلة / مستشارون	قابلة	ممرضة

التشخيص (2): PMTCT (EID) المبكر للرضع	الولادة @ NAT	شهور 9@ و أسابيع 6 @ NAT	شهر 18
ماذا	اختبار PCR (اختياري)	اختبار PCR ، @ 6wks & 9 months: CTX و EPI	اختبار فيروس نقص المناعة البشرية السريع
أين	الأمومة: سحب الدم والمخبر لاختبار PCR	رعاية ما بعد الولادة استشارة متابعة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية	رعاية ما بعد الولادة استشارة متابعة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية
لمن	جميع الأطفال المولودين من أمهات مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية	جميع الأطفال المولودين من أمهات مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية	جميع الأطفال المولودين من أمهات مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
أين	عند الولادة	أولاً في عمر 4-6 أسابيع الثاني في 9 أشهر	في عمر 18 شهراً (وبعد 6 إلى 12 أسبوعاً من التوقف عن الرضاعة الطبيعية) إذا كانت NAT السابقة سلبية أو لا يمكن الوصول إليها
من	ممرضة ، قابلة ، فني مختبر	ممرضة ، مسؤول عيادة ، قابلة ، فني مختبر	ممرض ، مسؤول عيادة ، قابلة ، فني مختبر ، مستشارون

يمكن أن يكون للتوصيات بشأن الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل فيما يتعلق بمضادات الفيروسات القهقرية للوقاية من الأطفال المعرضين لخيارات مختلفة حسب السياق والتحديات المتعلقة بالإعطاء. نقتراح عليك اتباع توصيات النظام من وزارة الصحة ومناقشتها مع المرجع المعني بفيروس نقص المناعة البشرية لتحديد الإستراتيجية الأكثر ملاءمة لتوصيات منظمة أطباء بلا حدود.

وبالمثل ، في حين أن اختبار الرضع المعرضين هو مكون رئيسي في الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ، فقد لا يكون الوصول إلى الاختبارات القائمة على الفيروسات (أي جهاز Xpert متاحاً. في هذه الحالات ، ضع في اعتبك إحالة العينات) باستخدام بقعة الدم الجافة (DBS) - أو الاختبار السريع لفيروس نقص المناعة البشرية بعد المناقشة مع مرجع فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بك.

يمكن أيضاً إجراء اختبار الشريك في رعاية ما قبل الولادة باستخدام الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية (HIVST). يعد HIVST أداة مقبولة وفعالة لزيادة اختبار الشريك والإفصاح عنه (منظمة الصحة العالمية ، 2018) ¹¹

¹¹ <https://www.who.int/hiv/pub/self-testing/strategic-framework/en/>

الوقاية من السل

	الإجراءات الإدارية	الإجراءات المحيطة	الإجراءات الشخصية	إدارة LTBI
ماذا	تدفق المرضى وفرزهم ، وسياسة مكافحة عدوى لدى المنشأة	النوافذ المفتوحة تدفق الهواء	N95 أقنعة للمرضى ، أقنعة للموظفين والقائمين على رعايتهم	تتبع الاتصال ، وفحص عدوى السل النشط وعلاج العدوى الكامنة / العلاج الوقائي من السل (TPT)
أين	منشأة صحية	مرفق صحي منزل / مجتمع	المرفق الصحي والمجتمع	المرفق الصحي والمجتمع
لمن	جميع المرضى والزوار والموظفين	جميع المرضى + أفراد الأسرة والزوار والموظفين	والموظفين و PWTB جهات الاتصال	جهات اتصال PWTB مرضى فيروس نقص المناعة البشرية
متى	طوال الوقت	طوال الوقت	أثناء العدوى . جميع PWTB المقترضيين ؛	بعد تشخيص السل من جدول الحالات. بشكل روتيني في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.
من	النقطة المحورية لمكافحة العدوى وMAM	النقطة المحورية لمكافحة العدوى وMAM كل الموظفين	موظفو المنشأة الصحية	CHW ، (تحديد) علاج / CO / MD / ممرضة

تبدأ الإجراءات الأساسية لمنع انتقال عدوى السل بتنظيم المنشأة الصحية نفسها ، مما يقلل فرصة انتقال العدوى في غرف العلاج ومناطق الانتظار. يُنصح في المشافي بضمان مساحة لغرف منفصلة وجيدة التهوية لعزل مرضى السل المشتبه بهم (أكثر عدوى) ومرضى السل المؤكدين بشكل منفصل عند العلاج. يعد ضمان تدفق الهواء الآمن في المبنى وتحديد المرضى المصابين بالسعال أمثلة جيدة للتدابير الإدارية والبيئية التي يمكن اتخاذها. استشر مستشار المياه والصرف الصحي أو مرجع IPC في القسم الخاص بك. هناك دورات متخصصة متاحة لمكافحة عدوى السل. انظر أيضًا إلى الإرشادات الخاصة بفصل مرضى السل في كتيب لمنظمة أطباء بلا حدود لمنشأة الرعاية في حالة السل.

مثال على تدابير الحماية الشخصية الأساسية هو استخدام الأقنعة الجراحية من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين لتقليل كمية القطرات / العصبية التي يتم إطلاقها في الهواء والتي من المحتمل أن تلوث الأشخاص الآخرين. مرشحات N95 عبارة عن أقنعة للموظفين ومقدمي الرعاية لحمايتهم من الإصابة بالسل أثناء الاستشارات وأنشطة الرعاية الأخرى.

في حين أن الأقنعة مهمة ، فمن الضروري أن نتذكر أن الإجراءات الأكثر فعالية للحد من انتقال السل هو تحديد وتأكيده وبدء العلاج الفعال للسل في أسرع وقت ممكن في PWTB.

مزيد من المعلومات حول الموضوعات الأخرى المتعلقة بالوقاية من السل وإدارتها الفنية أو السريرية ، على سبيل المثال. يمكن العثور على لقاح BCG في الدلائل الإرشادية لمكافحة السل (الملحق 5).

تعتبر إدارة الأفراد الذين تعرضوا لمرض السل ومراقبة التطور النهائي للسل بعد الاتصال ، وتتبع الاتصال والمتابعة من الأنشطة المهمة للغاية. من خلال فحص واختبار الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بالمرضى ، يمكن اكتشاف السل وعلاجه مبكرًا. يمكن أيضًا تحديد الأفراد المصابين بعدوى السل الكامنة وعلاجهم وفقًا لذلك¹³ انظر أيضًا فصل اختبار السل حول اكتشاف الحالات الإيجابية والسلبية وتتبع المخالطين.

¹² MSF, Tuberculosis Health Facilities Design Handbook, Médecins Sans Frontières, 2017

¹³ https://www.who.int/tb/areas-of-work/preventive-care/ltbi_faqs/en/

اكتشاف الحالة واختبارها

في فصل البحث والاختبار هذا ، ننظر في كيفية بدء الاختبار والاستراتيجيات للعثور على الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى تقييم فيروس نقص المناعة البشرية أو السل. إرشادات للإشارة إليها عند التنفيذ: إرشادات وزارة الصحة بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية ومختبرات أطباء بلا حدود (انظر الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ نعم ، التدريب على كيفية استخدام الاختبارات والتدريب الإرشادي. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والسل (انظر قسم المختبر) ، ومواد إعلامية ، وبروتوكولات للموظفين.

اكتشاف حالة واختبار فيروس نقص المناعة البشرية

	بدأ المزود بالاستشارة والاختبار: PICT	الاستشارة والاختبار الطوعي: VCT
ماذا	اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الاستشارة (قبل الاختبار وبعده)	اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الاستشارة (قبل الاختبار وبعده)
أين	مرفق صحي (العيادات الخارجية ، IPD ، جناح السل ، جناح التغذية ، الأمومة وANC	المرافق الصحية والمجتمع
لمن	حالات افتراضية / مشتبه بها مثل ؛ SAM ، TB ، KA ، المرضى الذين يعانون من OIS ، النساء الحوامل	عامه السكان
من	مرمضة ، قابلة ، طبيب ، CO تحديد وإحالة المستشار (إذا تم تدريبه / سُمح له بإجراء الاختبار)	المستشارون / العاملون العاديون (إذا تم تدريبهم) ، الطاقم الطبي ، المريض (الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية)

مطلوب تشخيص مؤكد لفيروس نقص المناعة البشرية قبل البدء في علاج¹⁴ لفيروس نقص المناعة البشرية. هذا أمر بسيط ويمكن القيام به مع اختبارات التشخيص السريع (RDTs) (دائمًا ضمن خوارزمية اختبار تم التحقق من صحتها) والاستشارات قبل الاختبار وبعده.

يمكن أن يركز اختبار فيروس نقص المناعة البشرية على مجموعات ضعيفة محددة إذا كانت القدرة على الفحص والاختبار محدودة ، على سبيل المثال PWTB ، الأمهات الحوامل في ANC ، الأطفال في برامج التغذية والمرضى المصابين بأمراض شديدة في IPD و OPD. في الاستشارة والاختبار الذي يبدأه مقدم الخدمة أو PICT ، يوصي مقدم الرعاية الصحية على وجه التحديد بإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية للمريض الذي يشتبه في إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية.

إذا كان للمشروع سعة أكبر ، يمكن أن يتطور الاختبار والفحص لتقديم خدمات الاختبار لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الاختبار ، حتى لو لم يشعروا بالمرض. وهذا ما يسمى الاستشارة والاختبار الطوعيين أو VCT. أفضل مستوى للممارسة هو أن يكون لديك قسم VCT حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع القدوم للاختبار وللحصول على خدمات اختبار مستمرة في جميع أقسام المستشفى / المنشأة الصحية ، بما في ذلك العيادات الخارجية ، IPD ، ANC ، إلخ.

يعد الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية (HIVST) نهجًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار. HIVST هي عملية يقوم فيها الشخص بجمع عينته الخاصة (مثل اللعاب) ، وإجراء الاختبار ، وتفسير النتيجة ، بمساعدة أو بدون مساعدة ، في مكان عام أو خاص. يؤدي تنفيذه إلى زيادة الوصول بشكل خاص إلى الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها ، والسياقات التي لا يزال فيها وسم فيروس نقص المناعة البشرية مرتفعًا ، ولا سيما لأولئك الذين لم تصلهم حاليًا خدمات الاختبار الحالية (الفئات السكانية الرئيسية ، الرجال والشباب).

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل HIVST على تحسين تغطية الاختبار من خلال دمج هذه الاستراتيجية في الخدمات السريرية حيث يكون الاختبار مطلوبًا ولكن لا يتم تقديمه بشكل روتيني أو حيث يتم تنفيذ الاختبار بشكل سيئ ، على سبيل المثال ، في العيادات ذات الحجم الكبير في الأماكن ذات العبء المرتفع لفيروس نقص المناعة البشرية وفي عيادات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو تنظيم الأسرة (منظمة الصحة العالمية ، 2018).¹⁵

مطلوب دائمًا التأكيد من خلال خوارزمية الاختبار الوطنية التي تم التحقق من صحتها. حاليًا ، تم التحقق من صحة جهاز Oral Quick (OraSure) في كندا وجات MSF لاستخدامه في عينات السوائل الفموية.

¹⁴ <https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/>

¹⁵ <https://www.who.int/hiv/pub/self-testing/strategic-framework/en/>

اكتشاف حالة السل واختبارها

	إيجاد حالة سلبية	اكتشاف حالة نشطة
ماذا	اكتشاف و تشخيص حالة السل السلبي	اكتشاف حالة السل النشط و تشخيصها
أين	منشأة صحية	المجتمع
لمن	الأشخاص الذين سيتم تقييمهم لمرض السل و مخالطتهم	الأشخاص الذين سيتم تقييمهم لمرض السل و مخالطتهم
من	ممرضة ، ملراء ، مسؤولون ، مستشارون مدربون	العاملين الصحيين المجتمعيين ، العمال العاديين المدربين / الأقران ، سفراء السل

تُركز اكتشافات الحالة السلبية على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات وأعراض السل الذين يصلون إلى المرفق الصحي ، وهو ما يجب القيام به كمعيار أساسي في كل مرفق. في المرحلة الأولية من البرنامج حيث تكون السعة محدودة ، يمكن أن يقتصر اكتشاف حالات السل على الكشف السلبي عن الحالات ، بما في ذلك تقييم المرضى الذين يعانون من مخاطر عالية للإصابة بالسل ، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وسوء التغذية في IPD والمخالطين المعروفين لـ PWTB.

حيثما تتوفر سعة إضافية ، يمكن البحث عن حالة نشطة. يخرج فريق من العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين أو العاملين العاديين بنشاط للبحث عن حالات السل ومخالطتهم في المجتمع.

لتشخيص السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة ، يعد Xpert MTB / RIF أفضل اختبار مخبري في الطب السريري. ومع ذلك ، فإن هذا غير متاح في العديد من الأماكن ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام الفحص المجهر مع الخوازميات السريرية. عادة ما يكون هناك حاجة إلى معمل إحالة جيد لضمان اختبار الجودة ، بما في ذلك مراقبة الجودة. لمزيد من المعلومات ، راجع فصل المختبر. يتطلب جمع قشع السل نفسه إعدادًا منفصلاً في المرفق الصحي مع تدابير جيدة لمكافحة العدوى لتجنب التلوث / الانتقال العرضي (من الناحية المثالية كشك البلغم). لمزيد من المعلومات حول جمع العينات (المتقدم) ، يرجى الرجوع إلى الدلائل الإرشادية السريرية لمرض السل (انظر الملحق 5).

عندما تتوفر أشعة الصدر السينية (CXR) ¹⁶ يمكن أن تكون اختبارًا إضافيًا مفيدًا لأولئك الذين يعانون من اختبارات بكتريولوجية سلبية ، وخاصة عند الأطفال.

يتم أيضًا اختبار الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS) كأداة لتشخيص مرض السل. تم تطوير تقنية تسمى FASH: التقييم الموكّر مع التصوير فوق الصوتي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل ، للأماكن ذات الموارد المحدودة ، للمساعدة في تشخيص مرض السل خلع الرئة (EPTB) وأشكال السل المنتشرة (TB) في المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ¹⁷. يرجى ملاحظة أنه لتعلم ودمج الموجات فوق الصوتية بشكل مناسب في مشروع فيروس نقص المناعة البشرية والسل يتطلب تدريبًا عالي الجودة - يمكن للمواقع المهمة الاتصال بمراجعها ومجموعة عمل التصوير التشخيصي لمنظمة أطباء بلا حدود للحصول على مزيد من النصائح حول هذا الأمر.

اختبار السل الآخر هو اختبار البول TB-LAM. هذا هو شريط اختبار سريع يستخدم عينة بول (وهو أسهل في التجميع من عينة البلغم ومع مخاطر أقل للسيطرة على العدوى). نظرًا للحساسية والنوعية دون المستوى الأمثل ، لا يمكن استخدامه كفحص عام أو اختبار تشخيصي لمرض السل ، ومع ذلك ، فقد أظهر حساسية محسنة لدى الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تُوصي منظمة أطباء بلا حدود (وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية القادمة) باستخدام هذا الاختبار لجميع الأشخاص الموجودين في المستشفى (البالغين والأطفال) المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وللبالغين / الأطفال الذين تظهر عليهم

¹⁶ <https://www.who.int/tb/publications/chest-radiography/en/> (Chapter 1.4 gives a good overview of the use of chest X-rays)
https://www.who.int/tb/publications/Radiography_TB_factsheet.pdf?ua=1

¹⁷

https://msfintl.sharepoint.com/:b:/s/msfintlcommunities/DIWG/ESYiQgPbYnZNtZVi_T4xVA4BDYMGryc4304a0l0m6_zCqg?e=eHcSHL (for more references see annex 5)

¹⁸ https://www.who.int/tb/publications/factsheet_if_lam.pdf New WHO recommendations are coming out soon.

علامات / أعراض السل (بغض النظر عن CD4) أو فيروس نقص المناعة البشرية المتقدم: الأطفال أقل من 5 سنوات سنة أو $CD4 < 200$ أو منظمة الصحة العالمية المرحلة 3-4 (بغض النظر عن العلامات أو الأعراض).

علاج فيروس نقص المناعة البشرية

يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة البشرية (على وجه التحديد خلايا CD4) بمرور الوقت ، وإذا تُرك دون علاج ، يضعف جهاز المناعة ويصبح المريض عرضة للإصابة بعدوى أخرى (تسمى "العدوى الانتهازية") ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. لمنع هذا ، توصي الإرشادات الحالية "الاختبار والمعالجة" دون تأخير. يقوم العلاج بقمع فيروس نقص المناعة البشرية بحيث يظل جهاز المناعة سليماً. مبادئ توجيهية للإشارة إليها عند التنفيذ: إشارات سريرية لفيروس نقص المناعة البشرية ؛ وزارة الصحة ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة أطباء بلا حدود (الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ نعم ، يحتاج الطاقم الطبي إلى تدريب على رعاية فيروس نقص المناعة البشرية. انظر الجزء الثالث لمزيد من المعلومات حول خيارات التدريب. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، أدوية وعقاقير فيروس نقص المناعة البشرية للوقاية من العدوى الانتهازية وعلاجها. الاختبارات المعملية ضرورية للرصد.

	الوقاية / OI علاج	إدخال شخص ART	مراقبة ART	اعادة تعبئه ART
ماذا	باقة الرعاية الطبية Co-trim الوقاية من	انظر الإرشادات (ART (السريرية المحدثة)	العبي أو الحمل الفيروسي مراقبة المختبر (للأحداث السلبية) المراقبة السريرية (مثال: الوزن)	سرف الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية للمريض
أين	IPD أو OPD	استشارات الرعاية الصحية الأولية IPD مستشفى	استشارة ومختبر الرعاية الصحية الأولية	مسار الصيدلة السريع الجماعات المحلية بالمنشآت الصحية ART نوادي
لمن	CD4 المرضى الذين يعانون من خلية / مم 3 ، تم قبول < 200 IPD المرضى في	من المجموعات المستهدفة المرضى جدا ، السل ،) إلى جميع المصابين (ANC بفيروس نقص المناعة البشرية	جميع المرضى يخضعون للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية	DSD → نقاط ثابتة عيادة نقاط غير مستقرة DSD → الأطفال → المجموعات السكانية الرئيسية DSD
متى	مبلثرة بعد الاختبار / التشخيص	في غضون 7 أيام بعد الاختبار ، في نفس اليوم إذا كان ذلك ممكناً	أشهر ثم سنويًا 3-6	أشهر ثم سنويًا 3-6
من	مسؤول الطب السريري أو طبيب طبي	مسؤول الطب السريري ، ممرض ، مستشار	ممرضة ، فني مختبر	دعم الزملاء ، ممرضة ، مستشار ، صيدلية

التوصية الحالية هي بدء العلاج المضاد للفيروسات القهقرية لجميع الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أقرب وقت ممكن بعد الاختبار. قد يكون الاستثناء (البرنامجي) الذي يمكن أن يؤخر ذلك تدخلاً طارئاً حيث ينصب التركيز الأولي على ضمان استمرارية العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والسل. يمكن القيام بذلك عن طريق إعادة تعبئة الإمدادات الدوائية للأشخاص الذين يتلقون بالفعل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية والسل وعن طريق تحديد وإحالة الأفراد المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري الذين يعانون من مضاعفات سريرية خطيرة ومرضى متقدم (انظر الجزء الرابع من هذا الدليل لمزيد من المعلومات حول السياقات الخاصة).

يمكن استخدام بروتوكولات وزارة الصحة حيث يتم تحديثها وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الحالية. في حالة عدم وجود إرشادات محدثة من وزارة الصحة ، يمكن استخدام إرشادات منظمة أطباء بلا حدود لفيروس نقص المناعة البشرية / السل لعام 2018¹⁹ وغيرها من الإرشادات التي توصي بها منظمة أطباء بلا حدود أو منظمة الصحة العالمية.

كحد أدنى ، يمكن تدريب ممرضة ومستشار على تشغيل مكون متكامل لفيروس نقص المناعة البشرية / السل بالتشاور مع طبيب المشروع الحالي في الحالات الصعبة و / أو إحالة فيروس نقص المناعة البشرية / السل حيث لا توجد خبرة سريرية في المشروع. هناك تشجيع قوي لضمان أن الطريقة التي يتم بها تقديم رعاية فيروس نقص المناعة البشرية تتناسب مع احتياجات العملاء وتعكس التفضيلات والتوقعات لتلبية احتياجات مجموعات مختلفة من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (PLWHIV) مع تقليل العبء غير الضروري على النظام الصحي. وهذا ما يسمى تقديم الخدمة المتميزة أو DSD: ²⁰ على سبيل المثال يمكن "التتبع السريع" لتسليم العلاج المضاد للفيروسات القهقرية مبلشرة من الصيدلية على فترات تتراوح بين 3 و 6 أشهر ، مما يلغي الحاجة إلى المرضى المستقرين للخضوع للاستشارة إذا لم يكن ذلك مطلوباً. النماذج البديلة الأخرى لتقديم العلاج المضاد للفيروسات القهقرية أقرب إلى المجتمع ، مثل التسليم من خلال مجموعات ART المجتمعية (CAGs) أو نوادي الالتزام أو PODI (بالفرنسية: "Poste de Distribution de TARV communautaire")²¹ يجب أن تكون التسهيلات للقبول أو الإحالة إلى المرافق المناسبة متاحة للمرضى المصابين بشدة.

يمكن أن تكون طلبات الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية صعبة ؛ لذلك ، تم تطوير أدوات للمساعدة في حساب الأرقام وتضمين جميع الأدوية المطلوبة (انظر الملحق 2). يتم ترتيب عقاقير العدوى الانتهازية (OI's) ضمن عملية الترتيب الروتينية.

علاج السل

الهدف من علاج السل هو شفاء المريض من مرض السل. يتكون العلاج من مجموعة من الأدوية ، اعتماداً على الأدوية التي تكون البكتيريا حساسة لها. يتم علاج السل الحساس لمدة 6 أشهر. يتطلب السل المقاوم مدة علاج أطول وأدوية مختلفة يصعب تحملها في كثير من الأحيان. إرشادات للإشارة إليها عند التنفيذ: الدلائل الإرشادية السريرية الوطنية لمكافحة السل (محدثة) ، منظمة الصحة العالمية ، منظمة أطباء بلا حدود (الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ نعم ، يحتاج الطاقم الطبي إلى تدريب على رعاية مرض السل. انظر الجزء الثالث لمزيد من المعلومات حول خيارات التدريب. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، أدوية السل. الاختبارات المعملية ضرورية لرصد الاستجابة للعلاج واختبار المقاومة للأدوية المضادة للسل.

السل الحساس للأدوية:

المراقبة	إعادة تعينه	بدء العلاج	DSTB
المتابعة السريرية الآثار الجانبية: سريرية ومخبرية إن وجدت	العلاج الذاتي (SAT) من ATT	FDC في (ATT) العلاج المضاد للسل (توكيبية جرعة ثابتة)	ماذا
مرفق صحي للمشروع	مرفق صحي أو مجتمع	مرفق صحي للمشروع	أين
بعد أسبوعين ، شهرين (قبل مرحلة المتابعة) ، و 5 أشهر (اختبارية الزيارة الأخيرة في 6 أشهر)	كل شهر الى شهرين ضع في اعتبارك عبوات أطول للسكان المتنقلين / حالات الطوارئ	بعد التشخيص السريري أو المخبري (و / أو اللطاخة Xpert MTB / RIF)	متى
ممرضة ، مسؤول الطب السريري	ممرضة ، مسؤول الطب السريري ، صحة الطفل	ممرضة ، مسؤول الطب السريري ، دكتوراه في الطب	من

¹⁹ <https://samumfsf.org/en/resources/msf-hivtb-clinical-guide-2018#>

²⁰ <http://www.differentiatedcare.org/Resources/Library>

²¹ <https://samumfsf.org/en/resources/hiv/differentiated-art-delivery/art-distribution-point-podi-toolkit>

السل المقاوم للأدوية:

MDRTB	بدء العلاج	تسليم الأدوية		مراقبة
ماذا	قصير MDRTB نظام (مثالي في الإعدادات غير المستقرة) طويل مع MDRTB نظام الأدوية عن طريق الفم (إذا تم بطلان الدورة القصيرة)	يومي DOT الحقن اليومي	توريد شهري (SAT) تحت لشراف حقنة يومية	المتابعة السريرية الثقافة والمسحة للاستجابة للعلاج ؛ DST ، الآثار الجانبية: قياس السمع والكرياتينين إذا كان عن طريق الحقن ECG. QTc. إذا زادت الأدوية من (TSH الترانساميناسات ،) مختبر
أين	منشأة صحية	منشأة صحية	المنزل المجتمع/	منشأة صحية
متى	بعد التشخيص المختبري (Xpert MTB / RIF و / أو (ثقافة السل	أثناء مرحلة الحقن	طوال فترة العلاج	شهري
من	طبيب ، مسؤول الطب السريري ، ممرضة	عامل رعاية صحية	العاملين الصحيين المجتمعيين أو أحد أفراد الأسرة أو العامل العادي	طبيب ، مسؤول الطب السريري ، ممرضة

كحد أدنى ، تحتاج المشاريع إلى توكيبة جرعة ثابتة (FDC) من أدوية السل الحساس (DSTB) للبالغين والأطفال. توكيبة الجرعة الثابتة تجعل الوصفة الطبية أسهل لكل من الطبيب والمريض. بالنسبة للسل المقاوم للأدوية ، لا تتوفر أدوات ترتيب أدوية السل للمساعدة في الحساب والترتيب (انظر الملحق 2).

يمكن بدء العلاج بناء على الاشتباه السريري وحده ، في حالة عدم توفر الاختبارات التشخيصية (انظر الملحق 5 ؛ دليل السل). بالطبع ، يُفضل التأكيد عن طريق الاختبارات المعملية ، عبر جهاز Xpert أو الفحص المجهرى ، سواء في المشروع أو عن طريق الإحالة. يرجى ملاحظة أن تأكيد المختبر يكون أكثر صعوبة عند الأطفال وأولئك الذين يعانون من كبت المناعة الشديد ، بغض النظر عن الوصول إلى اختبار Xpert. في هذه الحالة ، تعد الخوارزمية السريرية والعلاج في الوقت المناسب منقذين للحياة.

أثناء العلاج ، يجب مراقبة الحالة السريرية والالتزام والآثار الجانبية. تحتاج عقاقير DSTB إلى اللامركزية قدر الإمكان في المجتمع عن طريق العلاج الذاتي (SAT) ، حيث يكون ذلك ممكنًا تحت إشراف أحد أفراد الأسرة أو العامل المجتمعي بعد التثقيف المناسب للمريض.

يجب أن تهدف جميع المشاريع العادية إلى الحصول على إمكانية تشخيص DRTB وإما بدء العلاج أو الإحالة إليه. علاج MDR (9-12 شهرًا) هو الخيار المفضل في الظروف غير المستقرة. يوجد حاليًا الكثير من التقدم الذي يتم إحرازه لتحسين نظم علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة وتجنب الحقن (جميعها عن طريق الفم) وفي نظم علاجية أقصر ؛ ناقش مع المرجع الخاص بك في لحظة اتخاذ قرار بشأن نظم علاج MDRTB.

يمكن توصيل أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة إما في العيادة أو في المجتمع (في المنزل) اعتمادًا على راحة المريض. في العيادة يمكن دمج DOT مع الحقن اليومي. يمكن أيضًا توصيل أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة في المجتمع من البداية بما في ذلك الحقن حيث يكون العامل المجتمعي قادرًا على إعطاء الحقنة اليومية ؛ في هذه الحالة ، يمكن الإشراف على DOT من قبل عامل المجتمع و / أو أحد أفراد الأسرة.

السل المقاوم للأدوية على نطاق واسع (XDR) وأنماط المقاومة الأخرى نادرة في معظم الظروف ، ولكن عند مواجهة مثل هذه الحالات ، استشر مرجع فيروس نقص المناعة البشرية / السل الخاص بك.

ملاحظة على التغذية

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / السل من سوء التغذية ، وسوء التغذية الحاد هو عامل مستقل للوفاة. يمكن أن تدعم المكملات الغذائية تعافيتهم من خلال تقوية مناعتهم وتحسين زيادة الوزن وقوة العضلات.

يمكن أن يشمل الدعم الغذائي (الحصة) للجميع مكمل للطاقة والبروتين يعتمد على الغذاء المتاح محليًا لفترة محددة من شهرين يمكن بعدها النظر في استمرارها لأولئك الذين يعانون من SAM / MAM اعتمادًا على مؤشر كتلة الجسم (BMI).

$$\text{BMI} = \frac{\text{الوزن (kg)}}{(\text{الارتفاع (m)})^2}$$

يرجى الرجوع إلى إرشادات التغذية لمنظمة أطباء بلا حدود للحصول على إرشادات سريرية (معايير التضمين ، والحصص الغذائية ، وما إلى ذلك) حول التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية والسل. يوجد أيضًا فصل منفصل عن التغذية في المبادئ التوجيهية لـ SAMU (الملحق 5).

(PSEC) دعم المريض والتعليم والإرشاد

PSEC HIV			
	معلومات واستشارات ما قبل الاختبار	استشارة ما بعد الاختبار	تثقيف المريض واستشارات الالتزام
ماذا	معلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية	تقديم المشورة للعملاء بشأن نتيجة الاختبار	تثقيف المرضى لإدارة علاجهم ومرضهم بأنفسهم
أين	غرفة الانتظار ، غرفة الاستشارة / الاستشارة	غرفة خاصة في المنشأة الصحية	غرف المرافق الصحية و / أو المجتمع
لمن	المجموعة والفرد	بشكل فردي ، أزواج أو شباب مع والديهم ،	المجموعة والفرد
متى	قبل اختبار فيروس نقص المناعة البشرية	بعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية	أثناء علاج فيروس نقص المناعة البشرية وفقاً لاحتياجات الشخص. إذا كانت هناك مشاكل في الالتزام. في جميع حالات الفشل الفيروسي المشتبه به (مشورة الالتزام المعزز) يجب الإفصاح للأطفال في السن المناسب
من	الطاقم الطبي والمستشارون والعاملون الصحيون المجتمعيون والموظفون غير المتخصصين المدربين	الطاقم الطبي والمستشارون والموظفون المدربين والمرضى الخبراء	الممرضات ، المستشارون ، موزعات الصيدليات ، العاملين الصحيين المجتمعيين ، الموظفين العاديين المدربين

تعتبر الاستشارة قبل وبعد الاختبار جزءاً لا يتجزأ من اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن توفر جلسة المعلومات قبل الاختبار عند إجراؤها في مجموعات الوقت. يتم إجراء الاختبار اللاحق دائماً بشكل فردي وسري ، بواسطة مستشار أو عامل عادي تم تدريبه خصيصاً لدعم المريض بعد سماع نتيجة الاختبار.

عندما لا تكون السعة كافية ، يمكن أن يقتصر الاختبار وبالتالي الاستشارة على مجموعات ضعيفة محددة مثل PWTB ، ومرضى Kala Azar ، والمرضى الذين يعانون من العدوى الانتهازية ، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية (SAM) ، والأطفال الذين يعانون من تعثر النمو ، والنساء الحوامل ، والمرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، مرضى AEB و IPD (انظر أيضاً الفصل الخاص بالاختبار).

يعد تثقيف المريض واستشارته جزءاً من علاج فيروس نقص المناعة البشرية لجعل المرضى قادرين على إدارة علاجهم والتعايش مع مرضهم. يمكن القيام بذلك عن طريق العديد من الأشخاص الذين يشركون في العلاج ، مثل الممرضات والمستشارين ، ولكن أيضاً موزعات الصيدليات. وعلى مستوى المجتمع ، حيث يمكن أن يكون للعاملين في صحة المجتمع ومجموعات دعم المرضى تأثير كبير على دعم المريض. راجع المبادئ التوجيهية الخاصة بـ PSEC في الملحق 5 لمزيد من المعلومات.

السل PSEC

	التثقيف الصحي	تثقيف المريض واستشارات الالتزام
ماذا	التثقيف حول السل والاختبار	التثقيف حول أدوية السل والإدارة الذاتية للمرض
أين	غرف انتظار المرافق الصحية) العيادات الخارجية ، عيادة السل ، جناح التغذية ، عيادة فيروس نقص المناعة البشرية ، IPD) جهات الاتصال في المجتمع / الأسرة مرض السل	الاستشارة و غرف الاستشارة ، المستوصف

لمن	المرضى الجماعيون والأفراد في المرفق الصحي (العيادات الخارجية العامة ، فيروس نقص المناعة البشرية + ، التغذية ، IPD)	المرضى الجماعيون والأفراد الذين يخضعون لعلاج السل : DS / DR وربما مقدمو الرعاية وأفراد الأسرة
متى	قبل وأثناء وبعد الاستشارة وأثناء الزيارات المنزلية	أثناء علاج مرض السل
من	مرشد صحي (عامل عادي مدرب) ، صحة مجتمعية ، مستشار ، ممرضة	مستشار ، ممرضة ، صيدلي

كما هو الحال مع فيروس نقص المناعة البشرية ، وفيما يتعلق بتدابير IPC ، يمكن إجراء التثقيف الصحي حول السل في جلسة جماعية لتوفير الوقت إذا لزم الأمر. يمكن أن يركز التثقيف الصحي على مجموعات معينة ذات أولوية أولاً (مثل الموظفين والمجموعات المعرضة للخطر) ثم يتوسع لاحقاً ليشمل جميع المرضى في المرفق الصحي والأشخاص في المجتمع.

يعد تثقيف المريض وتقديم المشورة بشأن الالتزام جزءاً مهماً من علاج السل. يحتاج المريض إلى التشجيع والدعم لإكمال العلاج الذي غالباً ما يمثل تحدياً من أجل تحقيق نتائج العلاج المثلى. يعد الالتزام مهماً أيضاً لمنع مقاومة الأدوية ومنع انتقال العدوى. هناك حاجة ماسة إلى الحصول على الكثير من الدعم من مقدمي الرعاية والمجتمع لأن العلاج غالباً ما يتسبب في آثار جانبية ، والتي تزداد مع أنظمة الأدوية الأكثر تعقيداً لـ DRTB (M).

ملحوظة: هناك جداول ورقية متوافرة حول السل للمساعدة في جلسات التثقيف الصحي.²²

²² <https://samumsf.org/en/resources/tb/dr-tb/msf-tb-patient-education-and-counselling-flipchart-ds-tb-mdr-tb-xdr-tb-messages>

(CE) والمشاركة المجتمعية (HP) تعزيز الصحة

مع HP & CE ، يشارك المجتمع ويتم تمكينه منذ البداية. هذا مهم لقبول واستيعاب البرنامج الصحي وأنشطة الوقاية. يتضمن هذا الفصل أيضًا؛ تعزيز الخدمة ، وأنشطة التوعية على مستوى المجتمع ، والاجتماعات مع شبكات المجتمع / المرضى / المؤثرين في المجتمع ، واكتشاف الحالات النشط ، والبحث عن المواعيد المفقودة والمتابعة ونماذج مختلفة من الرعاية على مستوى المجتمع.

إرشادات للإشارة إليها عند التنفيذ: مجموعة أدوات SAMU حول نماذج متميزة للرعاية (CAGs ، PODIs ، إلخ) (الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ يجب تقديم التدريب الأساسي حول فيروس نقص المناعة البشرية / السل وتثقيف المريض / تقديم المشورة لفريق HP من قبل الطاقم الطبي. الحاجة إلى الدعم والإشراف المستمر من قبل المشرف. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ يجب تكييف أي مواد للترويج لنظام صحي مع السياق المحلي.

مجموعات دعم المجتمع ونماذج رعاية متباينة	العثور على حالة نشطة ، فوات المواعيد ، ضائعة للمتابعة وتتبع مخالطي (الأُسرة)	تعزيز الصحة بما في ذلك المناقشات الجماعية المركزة	الاتصال بالسلطات والمجتمع / الشبكات / أصحاب المصلحة.
مجموعات دعم المجتمع ونماذج رعاية متباينة	منع التقصير وانتقال العدوى	رسائل حول مناقشة مجموعة المركز الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / السل	لمناقشة و / اقتراح الأنشطة
PODIs ونوادي التقيد و CAGs وما إلى ذلك	المجتمع	المجتمع	المجتمع
المجتمع	المجتمع	اعضاء المجتمع	السلطات المحلية المؤثرون والمجموعات المجتمعية
سفراء السل ، PLWHIV	العاملين الصحيين المجتمعيين ، الممرضين ، العمال العاديين ، الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، سفراء السل	، CHW ، HP / CE مشرف ممرضة ، عامل عادي ، مرضى فيروس نقص المناعة البشرية ، سفراء السل	العاملين الصحيين ، أعضاء فريق المجتمعيين المشروع

على المستوى الأساسي للغاية ، يمكن أن يقتصر تعزيز الصحة والمشكلة مع المجتمع على الاجتماع مع السلطات ، وتقديم رسائل بسيطة على مستوى المجتمع ، وتعزيز الصحة في المرفق الصحي ، وتتبع المرضى الذين فاتتهم المواعيد من قبل عامل غير متخصص ، أو عامل صحة المجتمع أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

هناك مجموعة من طرق تعزيز الصحة التي يمكن استخدامها ، مثل الرسائل الإذاعية والمناظرة والمنشورات وما إلى ذلك. (انظر الملحق 5 لوثائق المرجعية).

عندما تزداد قدرة المشروع على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل ، يمكن تنظيم HP&EC الكامل لأنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل التي تهدف إلى زيادة الوعي وتقليل وصمة العار من خلال فريق HP&EC مدرب. المثالي هو أن يقوم الفريق بتنظيم مناقشات جماعية مركزة للحصول على فهم أفضل لتصورات فيروس نقص المناعة البشرية / السل في المجتمع والتخطيط لاستراتيجية HP&EC وفقاً لذلك.

يمكن أن يساعد هذا الفريق أيضًا في تنظيم أنشطة المجتمع لفيروس نقص المناعة البشرية / السل مثل مجموعات الدعم ونماذج تقديم العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المجتمعية ، مثل مجموعات العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية (CAGs) أو نقاط التوزيع في المجتمع (PODI) أو مجموعات الالتزام. تهدف نماذج الولادة المتميزة هذه إلى تحقيق اللامركزية في رعاية فيروس العوز المناعي البشري / السل وتحسين استبقاء المرضى المعالجين بمضادات الفيروسات القهقرية.

المخبر

المخبر: نقدم في هذا الفصل لمحة عامة عن الاختبارات المختلفة المستخدمة في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. هناك مستويات مختلفة من التعقيد.

المبادئ التوجيهية التي يجب الرجوع إليها عند التنفيذ: حزم تشخيص منظمة أطباء بلا حدود ، وإرشادات اختبار منظمة الصحة العالمية ، والمبادئ التوجيهية السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية والسل (انظر الملحق 5). هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ نعم ، يمكن إجراء بعض الاختبارات بعد تلقي التعليمات) مثل (RDTs) ، ويتم إجراء أدوات المخبر التشغيلي بواسطة فنيي المختبرات المدربين ، والذين يحتاجون إلى تلقي تدريب إضافي إذا كانت الأدوات جديدة أو محدثة. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، الاختبارات ، أدوات المخبر ، الكواشف ، الخراطيش ، إلخ .

فيما يتعلق بالاختبار الميداني ، تأخذ منظمة أطباء بلا حدود بشكل عام في الاعتبار المستويات التالية من الرعاية الصحية ؟²³ افتراضات الموارد البشرية التالية:

1. مركز رعاية صحية أساسية أو عيادة متنقلة بدون خدمات معملية (المستوى 1): يقوم الممرضون و / أو المسؤولون الإكلينيكيون / الأطباء بإجراء الاختبارات التشخيصية. لا يوجد طاقم مختبرات متخصص بشكل روتيني.
2. عيادة رعاية صحية أولية بها مختبر صغير (المستوى 2): طاقم المختبر الوطني (فني مختبر مبتدئ و / أو كبير) موجود.
3. مشفى بها قسم عام للمرضى الداخليين والخلجيين (المستوى 3 - المستوى 4 إذا كان مختبر الإحالة): يوجد فني مختبر أول (وطني أو وافد). يوجد فني الأشعة / تقني الأشعة السينية.

سيكون لكل من هذه المستويات قائمة مقابلة من الاختبارات التي تكون مجدية وفعالة من حيث التكلفة على هذا المستوى. تتراوح هذه الاختبارات من أكثر الاختبارات الأساسية المعروفة عمومًا باسم RDT ، إلى اختبارات أكثر تفصيلاً بما في ذلك اختبارات الكشف عن الحمض النووي واختبار حساسية المضادات الحيوية / المزرعة (يُحال الأخير عمومًا إلى مختبرات مرجعية وطنية أو دولية).

في حين أن بعض الاختبارات تقتصر بوضوح على المختبرات ذات المستوى الأعلى (مستوى المستشفى أو مختبرات الإحالة) ، يمكن استخدام اختبارات أخرى على نطاق أوسع ، على الرغم من أن توفرها يمكن / سيعتمد على حجم الاختبار. إذا اختارت المشاريع لإرسال عينات إلى منشأة أخرى للاختبار ، فيجب إنشاء نظام موثوق لجمع العينات ونقلها ويجب مراقبته من أجل الكفاءة.

تلخص الجداول أدناه الأنواع الرئيسية للاختبارات المتوفرة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل في بيئات منظمة أطباء بلا حدود على مستويات الرعاية الصحية المختلفة. للاختبار في مختبرات الإحالة ، يجب استشارة المرجع المختبر لقسمك للحصول على المشورة والتحقق من الصحة.

اعتبارات مهمة!

الخوارزميات: جميع الاختبارات المذكورة لا تعمل بمعزل عن غيرها ، بل لها مكان في الخوارزميات المحددة ، والتي تحتاج إلى تكييفها مع السياق ، بالاتفاق مع السلطات المحلية والسياسي ، وإحالات فيروس نقص المناعة البشرية / السل ، والمراجع المخبرية (انظر المبادئ التوجيهية).

آلة Xpert: يمكن استخدام هذه الأداة لكل من السل (تشخيص السل و MDRTB / Rif) وفيروس نقص المناعة البشرية (VL) و NAT ل EID) ، باستخدام خراطيش مختلفة.

²³ Described in the MSF diagnostic packages document: <https://samumfsf.org/sites/default/files/2019-07/Diagnostic%20packages%20FINAL%20update%2029.08.2017.pdf>

مخبر فيروس نقص المناعة البشرية

! ملاحظة: تم تغيير الجدول أدناه ، على عكس الجداول السابقة (بسبب عدد الاختبارات).

مقي	من	أين	هدف الاختبار	اختبارات
للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتأكيد حالة فيروس نقص المناعة البشرية عند استخدامه في خوارزمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.	موظف مدرب	المستويات 1 و 2 و 3.	للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وتشخيصه	HIV RDTs
يستخدم اختبار CD4 جنباً إلى جنب مع التقييم السريري لتقييم شدة المرض.	طاقم المختبر المدرين	المستوى 2 للمشروعات الرأسية باستخدام PIMA ، أو المستوى 3 مع PIMA أو أداة الطاولة ، اعتماداً على حجم الاختبار.	لمراقبة كمية CD4 ، مما يعطي مؤشراً على حالة المناعة وتطور المرض	اختبار CD4 عدة طرق بما في ذلك PIMA أخرى
كل 6 إلى 12 شهراً حسب المورد. بالنسبة للحالات ذات VL الأول < 1000 نسخة / مل ، يتم إعادة الاختبار بعد 3 أشهر لتأكيد الفشل الفيروسي بعد استشارة الالتزام.	طاقم المختبر المدرين	في المستوى 2 عند توفر Xpert (البرامج الرأسية) في المستوى 3 مع Xpert VL HIV-1 أو 4 (DBS) عندما يكون حجم الاختبار أقل.	لرصد كمية الفيروس (عن طريق تحديد كمية الحمض النووي الريبي) في الدم للإشارة إلى استجابة جيدة للعلاج أو الفشل أو مشكلات الالتزام	اختبار الحمل الفيروسي POC (العديد من طرق) Xpert القريبة ، مثل HIV-1 VL أو SAMBA (أو المختبر / الإحالة)
عند +/- 6 أسابيع وعند 9 شهور. بالإضافة إلى ذلك ، عند الولادة (عملياً 48 ساعة) إذا سمحت المورد والبرنامج بذلك.	طاقم المختبر المدرين	في المستوى 2 عند توفر Xpert (البرامج الرأسية) في المستوى 3 مع Xpert HIV-1 Qual أو 4 (DBS) عندما يكون حجم الاختبار أقل.	التشخيص المبكر لعدوى HIV-1 عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن 18 شهراً عن طريق الكشف عن الحمض النووي المؤيد للفيروس	التشخيص المبكر عدة (EID) للرضع طرق بما في ذلك Xpert HIV-1 Qual (أو المختبر / الإحالة)
CD4 < 200 خلية / مم ³ و / أو المرحلة 3 و 4 ، للاشتباه في التهاب السحايا بالمستشفيات	طاقم طبي مدرب و / أو طاقم مختبر	المستوى 2 في حالة توفر الاشتباه السريري أو اختبار CD4 ، المستوى 3 في جميع الحالات	للكشف عن عدوى المكورات الخبيثة	اختبار مستضد المكورات المشفرة (CrAg) ، تنسيق RDT الشريط
CD4 < 200 خلية / مم ³ و / أو المرحلة 3 و 4 > راجع توصيات الإرشادات السريرية.	طاقم طبي مدرب و / أو طاقم مختبر	المستوى 2 في حالة توفر الاشتباه السريري أو اختبار CD4 ، المستوى 3 في جميع الحالات	للكشف عن مستضد السل في البول	تنسيق TB-LAM RDT الشريط
أثناء العلاج	فني مختبر	مستوى 3.	لرصد الآثار الجانبية لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية	، (TDF) الكرياتينين ، (AZT) الهيموغلوبين ، (NNRTI) إنزيمات الكبد (PI)

التنميط الجيني لفيروس نقص المناعة البشرية (عدة أنواع من الفحوصات المخبرية)	لتشخيص الطفرات التي تدل على مقاومة العلاج المضاد للفيروسات الفهقرية	المستوى 4 (الإحالة) ، DBS. بشكل عام على	فني مختبر بمستوى أعلى	فشل الخط الثاني ، حالات مختلرة بعد إدخال مرجع لفيروس نقص المناعة البشرية
---	--	--	--------------------------	--

لمزيد من التفاصيل حول كل اختبار ، يرجى الاطلاع على إرشادات المختبر واستشارة مرجع المختبر الخاص بك عندما يكون لديك أسئلة.

باختصار (موجز) ، هناك اختبارات في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية لتشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والعدوى الانتهازية (OI's) ولرصد التقدم والآثار الجانبية المحتملة للعلاج المقدم.

لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية ، يمكن استخدام الاختبارات السريعة (RDTs) داخل خوارزمية معتمدة للوضع المحلي. الاختبارات السريعة سهلة الاستخدام نسبيًا بعد بعض التعليمات ولا تحتاج إلى مختبر إلا لمراقبة الجودة.

في السنوات الأخيرة ، أصبح اختبار الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية (باستخدام Xpert) وغيره من الاختبارات القريبة من POC متاحة أكثر وأكثر في الميدان وتعتبر في الوقت الحاضر ضرورية لمراقبة فعالية العلاج. يحتاج الجهاز إلى مختبر به مكيف هواء وموظفين ملابيين ، ولكن الخبر السار هو أنه يمكنه إجراء اختبارات لكل من فيروس نقص المناعة البشرية والسل. يقيس كمية جينوم فيروس نقص المناعة البشرية (RNA) في عينة ، ويسمى أيضًا "الحمل الفيروسي". يشير إلى ما إذا كان شخص ما لديه فيروس يمكن اكتشافه وكمياته في الدم ، لمعرفة ما إذا كان العلاج يعمل / يتم الالتزام به. يمكن لـ Xpert اختبار خرطوشتين مختلفتين لفيروس نقص المناعة البشرية ؛ واحد لـ VL وآخر مختلر لـ EID ، وخرطوشة لمرض السل (انظر فصل مختبر السل).

إذا كان المرفق لا يحتوي على Xpert للاختبار ، فيمكن نقل العينات باستخدام DBS: بقعة الدم الجافة: عينة دم مجففة على قطعة من الورق الماص ، مما يجعلها آمنة إلى منشأة أخرى ، لإجراء الاختبارات التالية:

- للخبراء Qual في حالة التشخيص المبكر للوضع (EID)
 - للحمل الفيروسي (VL) باستخدام PCR
- ملاحظة: لا يمكن استخدام عينات DBS لـ VL على Genexpert.

اختبار آخر مهم لتقييم شدة المرض هو اختبار CD4. يقيس هذا الاختبار كمية خلايا الدم البيضاء CD4 (تلك التي يهاجمها فيروس نقص المناعة البشرية). يشير عدد خلايا CD4 المتبقية إلى حالة الجهاز المناعي. عندما يكون عددها منخفضًا جدًا ، لا يعمل الجهاز المناعي للمريض بشكل جيد بعد الآن ، مما يجعل المريض عرضة للعدوى "الانتهازية" (OI's). يمكن إجراء اختبار CD4 باستخدام آلة قريبة من نقطة الرعاية (مثل PIMA) في معظم الإعدادات ، ويوصى به بشدة -> ولكن عدم وجود الجهاز لا ينبغي أن يمنع برامج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه.

يمكن الآن اختبار نوعين من العدوى الانتهازية الهامة من خلال اختبار سريع (RDT).
اختبارات CrAg لعدوى المكورات الخفية في المصل والسائل النخاعي واختبارات TB-LAM لعدوى السل باستخدام عينة بول. تنطبق التعليمات والقيود الخاصة بهذه الاختبارات - يرجى الرجوع إلى إرشادات المختبر وتوصيات منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية لمزيد من المعلومات.

المخبر السل

اختبارات	هدف الاختبار	أين	من	متى
الفحص المجهرى المسحة	لتشخيص ومراقبة مرض السل	المستوى 2 إذا كان البرنامج الرأسي بحجم كبير ، المستوى 3	فني مختبر ، ميكروسكوب	خط الأساس ، الشهر 2 و : DSTB ؛ 5 شهرية ؛ MDRTB ؛
Xpert MTB / RIF اختبار	لتشخيص مرض السل ، يجب أيضًا استخدام MDRTB	المختبر أو معمل الإحالة المستوى 2 إذا كان البرنامج الرأسي بحجم كبير ، المستوى 3	فني مختبر	مرضى فيروس نقص المناعة البشرية ، الانتكاس ، اشتباه الفشل ؛ يعتبر بمثابة اختبار أساسي ؛ في الأطفال أو EPTB
ثقافة السل و DST	واضبط DRTB قم بتأكيد العلاج وفقًا لذلك	المستوى 4 (الإحالة)	فني مختبر	عندما تعرض Xpert RR أو في أي DRTB مفترض ؛ لمتابعة مرضى السل المقاوم للأدوية المتعددة تحت العلاج
إنزيمات الكبد	لرصد الآثار الجانبية	مستوى 3	فني مختبر	في حالة الآثار الجانبية
الكرياتينين والأيونات و TSH	لرصد الآثار الجانبية لأدوية DRTB	المختبر	فني مختبر	بشكل روتيني

باختصار (موجز) ، توجد اختبارات لمرض السل لتشخيص ومراقبة المرض نفسه والآثار الجانبية المحتملة للأدوية. ولكن من المهم أيضًا معرفة ما إذا كانت بكتيريا السل مقاومة لبعض الأدوية أم لا ، لذلك يعرف الأطباء الأدوية التي يجب استخدامها لعلاج المرضى.

يُعد جهاز Xpert حاليًا الاختبار الموصى به للمشرع المراد تنفيذها ، لأنه يمكنه تشخيص مرض السل وأيضًا اختبار مقاومة الريفامبيسين (الدواء المضاد للسل الذي سيحدد MDRTB) في غضون ساعات قليلة. ومع ذلك ، قد لا يتوفر Xpert في بعض المشرع (على الفور). يمكن بعد ذلك استخدام الفحص المجهرى المسحي (كحد أدنى) لتشخيص السل ، جنبًا إلى جنب مع خوارزميات التشخيص السريري لتشخيص مرض السل السلبي.

يمكن للفحص المجهرى المسحة تشخيص مرض السل ، ولكن لا يمكنه تحديد ما إذا كانت هناك مقاومة للأدوية أم لا. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لمعرفة الدواء الذي لا تزال البكتيريا حساسة له ، فسيُلمز إرسال عينة إلى مختبر المستوى 4 أو مختبر مرجعي فوق وطني (SNRL) للثقافة (قد تستغرق النتائج عدة أسابيع).

إذا لم يكن هناك Xpert متاحًا في المشروع أو عندما يلزم إرسال الاختبارات للثقافة إلى مختبر الإحالة ، فيجب إعداد إحالة آمنة للعينة. اتبع الإرشادات الموصى بها دوليًا لنقل العينات البيولوجية.²⁴

يحتاج جمع العينات وتحضيرها إلى مساحة تتبع إجراءات مكافحة العدوى (IPC).²⁵

²⁴ https://www.who.int/csr/emc97_3.pdf

²⁵ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311259/9789241550512-eng.pdf>

المراقبة والتقييم

تتم مراقبة برامج منظمة أطباء بلا حدود وتقييمها لضمان المساواة والقدرة على التعلم من الأنشطة والتخطيط للمستقبل. يمكن إجراء الرصد والتقييم بطرق ومستويات مختلفة من التعقيد. إشارات للإشارة إليها عند التنفيذ: يرجى الرجوع إلى نظام معلومات الصحة في القسم الخاص بك ومتطلبات وزارة الصحة للرصد والتقييم. هل هناك حاجة إلى أي تدريب خاص؟ نعم ، خاصة في حالة قواعد البيانات الإلكترونية ، سيحتاج موظفو إدخال البيانات إلى التدريب على استخدام البرنامج. هل هناك حاجة إلى مواد خاصة؟ نعم ، قد يلزم طباعة أجهزة الكمبيوتر والنماذج / قواعد البيانات أو إتاحتها إلكترونياً .

تحتاج جميع المشاريع ذات الأنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / السل إلى جمع الحد الأدنى من مجموعة المؤشرات لرصد كمية ونوعية الأنشطة.

في حالة وجود أدوات مراقبة وتقييم للمرضى بوزارة الصحة ، يجب استخدامها وتعزيزها في بعض الأحيان (سجل السل ، سجل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، سجل ANC ، سجل منع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل) إذا لم تكن هناك أدوات وطنية ، يمكن للمشروع استخدام بطاقات منظمة الصحة العالمية القياسية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وسجلات مبسطة.

يمكن تكيف أدوات المراقبة والتقييم وعبء العمل مع احتياجات المشروع والموارد المتاحة. السجل الورقي كافٍ للبدء بأي مكون من مكونات فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل. للحصول على مستوى أكثر تفصيلاً ، توجد قواعد بيانات إلكترونية لجمع البيانات بأمان وإنشاء تقارير وتحليلات تلقائية. وهذا يتطلب تدريب الطاقم الطبي على استخدام البرنامج وتدريب كتابة إدخال البيانات على إدخال البيانات. بالطبع ، قد تكون هناك حاجة إلى كهرباء موثوقة ودعم تكنولوجيا المعلومات غالباً لتثبيت أي مشكلات وصيانتها وحلها.

مراقبة وتقييم فيروس نقص المناعة البشرية

	على الورق	إلكتروني
ماذا	جمع البيانات: بطاقة هوية المريض ، بطاقة العلاج ، بطاقة مراقبة الالتزام ، ملفات المريض. سجلات المرافق: تثقيف / إرشاد المريض ، سجل ART ، سجل PMTCT ، سجل معمل. التقارير الورقية: استخراج البيانات يدوياً لإعداد التقارير الشهرية (MSF) والتقارير الربعية (MOH)	جمع البيانات: جميع المستندات الورقية بالإضافة إلى: استملاء جمع البيانات برنامج الكمبيوتر / قاعدة البيانات (DHS1 قائمة الخطوط ، (EMR) DHS2 على سبيل المثال (Tier.net) ؛ إعداد التقارير الإلكترونية: التقارير الآلية وتحليل البيانات والتقارير السنوية
أين	منشأة HC	منشأة
لمن	ادخل بيانات جميع المرضى في المكون	ادخل بيانات جميع المرضى في المكون
متى	كل موعد و / أو عند الإشارة إليه	كل موعد و / أو عند الإشارة إليه
من	ممرضة ، مسؤول الطب السريري ، مستشار ، مساعد مختبر	موظف إدخال بيانات

مراقبة وتقييم مرض السل

	على الورق	إلكتروني
ماذا	<p>جمع البيانات: بطاقة هوية المريض ، بطاقة العلاج / بطاقة الالتزام ، +/- ملفات المرضى. سجلات المنشأة: سجل السل ، سجل الحالات المفترضة ، سجل جهات الاتصال ، سجل المختبر.</p> <p>الإبلاغ: استخراج البيانات يدويًا لإعداد التقارير الدورية الروتينية (أطباء بلا حدود ووزارة الصحة)</p>	<p>جمع البيانات: كل ما هو ورقي زائد: استمالات جمع البيانات برامج الكمبيوتر ، الخط ، EMR</p> <p>الإبلاغ: تقارير تلقائية للتقارير الدورية (أطباء بلا حدود ووزارة الصحة) وتحليل البيانات والتقارير السنوية</p>
أين	منشأة	منشأة
لمن	تم تتبع جميع PWTB المؤكدة والمشتبه بهم وجهات الاتصال	تم تتبع جميع PWTB المؤكدة والمشتبه بهم وجهات الاتصال
متى	في الموعد و / أو عند الاشارة	في الموعد و / أو عند الاشارة
من	ممرضة ، مسؤول الطب السريري ، مساعد مختبر	موظف إدخال بيانات

الملحقات

أدوات التقييم: 1 ملحق

تقييم حالة فيروس نقص المناعة البشرية / السل على المستوى الوطني

التنسيق / المستوى الوطني:	فيروس نقص المناعة البشرية	DSTB / DRTB
سكان البلد		
الوبائيات		
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين عامة السكان		
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في مختلف الفئات المعرضة للخطر		
فيروس نقص المناعة البشرية: التغطية: عدد البالغين تحت الرعاية / % على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية		
فيروس نقص المناعة البشرية: التغطية: عدد الأطفال تحت الرعاية / % على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية		
حدوث السل في البلاد		
السل: % MDR و XDR بين حالات السل		
آليات التمويل (الجهات المانحة والشراكات وآليات التنسيق)		
السياسات والمبادئ التوجيهية الوطنية		
السياسات الوطنية		
المبادئ التوجيهية السريرية الوطنية		
الخطط الاستراتيجية الوطنية		
DOT: TB مستحسن: صلوم / مرن N /		
التخطيط للطوارئ المعمول به: نعم / لا		
نقاط الضعف (عوامل عدم الاستقرار المحددة التي تؤثر على فهم فيروس نقص المناعة البشرية / السل وانتقاله والوقاية منه في المجتمع)		

التقييم الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة تجمع المياه / مشروع:

خدمة فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى المشروع		
مشروع أطباء بلا حدود	وزارة الصحة / جهات أخرى	
	توافر الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية:	
	الخط الأول: نعم / لا	
	الخط الثاني: نعم / لا	
	الخط الثالث: نعم / لا	
	أي انقطاع موثق للمخزون: نعم / لا	
	هل يمكن تخزين الأدوية بشكل آمن؟ نعم / لا	
	تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية:	
	تحديث خوارزمية اختبار منظمة الصحة العالمية الحالية؟ نعم / لا	
	متاح؟ نعم / لا CD4 هل اختبار	
	هل مراقبة الحمل الفيروسي تتم بشكل روتيني (كل شخص) أم مستهدفة؟ (قليل)	
	تثقيف المريض ودعمه واستشارته:	
	هل يتم تقديم أي دعم وتثقيف واستشارة للمرضى للأشخاص الذين يخضعون للعلاج؟ نعم / لا	
	هل الرعاية المنزلية متوفرة؟ نعم / لا	
	تكاملاً فيروس نقص المناعة البشرية والسل:	
	هل يتم فحص جميع مرضى فيروس نقص المناعة البشرية لمرض السل؟ نعم / لا	
	هل يتم تقديم رعاية فيروس نقص المناعة البشرية والسل في نفس الاستشارة (المشاورات)؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأين يتم توفير رعاية مرض السل لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية؟	
	نماذج الرعاية:	
	هل توجد نماذج متميزة للرعاية؟ نعم / لا	
	التباعد بين المواعيد؟ نعم / لا	
	المسار السريع؟ نعم / لا	

مجموعات ART المجتمعية؟ نعم / لا		
هل رعاية المرضى الداخليين متاحة؟ نعم / لا		
هل الرعاية التلطيفية متاحة؟ نعم / لا		
المشكلة المجتمعية:		
هل يوجد نظام لتعقب مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين فاتتهم مواعيد؟ نعم / لا		
هل توجد جمعية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية على مستوى المجتمع؟ مجموعات دعم فيروس نقص المناعة البشرية أو مجموعة أو جمعية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية: نعم / لا		
خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية:		
هل يتم توفير منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؟ نعم / لا		
هل نقل الدم الآمن متاح؟ نعم / لا		
هل الواقي الذكري متاح و متوفر للعملاء؟ نعم / لا		
هل يتم الختان الطوعي للذكور؟ نعم / لا		
رصد وتقييم:		
هل توجد سجلات لفيروس نقص المناعة البشرية وسجلات للمرضى؟ نعم / لا		
هل يتم الإبلاغ عن فيروس نقص المناعة البشرية على أساس ربع سنوي؟ نعم / لا ، إذا لم يكن كذلك ، فكم مرة؟		

التقييم الخاص بالسل في منطقة المستجمعات / المشروع

خدمة السل على مستوى المشروع		
	وزارة الصحة / جهات أخرى	مشروع أطباء بلا حدود
تشخيص		
الفحص المجهرى: لطاخة البلغم نعم / لا		
الثقافة: متوفر: نعم / لا DST المتوفر: نعم / لا المكان: MSF ،National ،SNRL		
متاح: نعم / لا Xpert: حيث PoC:، الإحالة إلى مستشفى آخر ، الإحالة إلى العاصمة		
نعم / لا متوفر SL: ،Hain MTB plus SNRLأين: مواطن ،		
نعم / لا متوفر TB LAM: ، العيادات الخارجية ، كلاهما IPD: حيث		
نعم / لا متوفر CXR:		
تتوفر التشخيصات للأطفال في: تحريض البلغم نضح البلعوم الأنفي غسل المعدة		
علاج		
استخدام عقاقير ضمان الجودة: نعم / لا		
هل تم توثيق انقطاع المخزون: نعم / لا		
علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة: نعم / لا		
نعم / لا MDR TB: نظام أقصر من		
استخدام وكيفية جديدة للأطفال: نعم / لا		
الوصول إلى الأدوية الجديدة: بيداكوبيلين: نعم / لا دلمانيد: نعم / لا		
توصيل الأدوية: DOT: مرفق ، مجتمع ، من المنزل يوم السبت: نعم / لا		
العدوى المرافقة لفيروس العوز المناعي البشري والسل		
الوصول إلى VCT: نعم / لا		
الوصول إلى ART: نعم / لا		

تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها		
تقييم مكتوب لمكافحة عدوى السل وخطة؟ نعم / لا		
نعم / لا IPT: مجموعة المرضى: >5 ، >15 ، فيروس نقص المناعة البشرية ، مخالطون للسل		
HP و PSEC أنشطة		
هل يتم تقديم الدعم والمشورة والتثقيف للمرضى بانتظام لمرضى السل المفترضين أو المؤكدين: نعم / لا		
توعية المجتمع بالسل: نعم / لا		
تتبع جهات الاتصال: نعم / لا		
تتبع المرضى الذين فاتتهم المواعيد: نعم / لا		

تقييم مشروع

مشروع التقييم والمرضى	
السياق	
سياق مستقر أو غير مستقر؟ نزاع؟	
حضري أو ريفي أو أي مكان آخر؟	
الهجرة: وجود نازحين أو رحل أو عمال مهاجرين؟	
المشكلة المجتمعية؟ نعم / لا	
قضايا وصمة العار؟ نعم / لا	
المرضى	
هل هناك مجموعات معرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل في منطقة مستجمعات المشروع؟ نعم / لا	
إذا كانت الإجابة بنعم ، ما هي المجموعات؟	
الأقسام	
حصر أقسام المنشأة الصحية والمشروع	
المختبر: ما هو مستوى ونوع الاختبارات المتوفرة على مستوى المشروع؟	
الموارد البشرية	
ضع قائمة بالموارد البشرية في المشروع	
جرد لمستويات التدريب على فيروس نقص المناعة البشرية والسل	
تقييم الحاجة إلى التدريب على فيروس نقص المناعة البشرية / السل	
خيارات الإحالة	
قائمة بجميع الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة المجاورة للمشروع	
هل الإحالة الآمنة للعينة ممكنة؟	
آليات الشراكة والتنسيق	
صف الثغرات في تقديم الخدمة في محيطك ، ضع في اعتراك الأوقات المستقرة وغير المستقرة	
ما هي قدرة الجهات الفاعلة الأخرى لإمدادات الطوارئ / خطة الطوارئ؟	

الملحق 2: أداة حساب ترتيب الأدوية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية

يمكن الوصول إلى أداة حساب طلب الأدوية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال رابط SharePoint أدناه للموظفين الذين لديهم تسجيل دخول في منظمة أطباء بلا حدود. إذا لم يكن لديك اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى منظمة أطباء بلا حدود ، فيرجى الاتصال بالمنسق أو المسؤول عن فيروس نقص المناعة البشرية / السل.

https://msfintl.sharepoint.com/:x:/r/sites/OCA-dept-PHD/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B647B17ED-E89D-44D1-973B-56DF6D243CCD%7D&file=MSF%20OCA-ARV%20tool%202019.xlsb&action=default&mobileredirect=true

الملحق 3: مجموعة أدوات الطوارئ متعددة الأقسام لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل 50

يحتوي هذا الملحق على لقطات من مجموعة الطوارئ الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل 50: المرضى المستمرين والجدد. يرجى طلب المشورة من مسؤول فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل الخاص بك لتحديد الحالة التي تتطابق مع وضعك والتي يجب استخدامها.

KI12 MEDICVNX
MEDICV7 KI12

III KWED J

KIT STARTING TUBERCULOSIS and HIV CARE, 6 months 2021

KIT DEMARRAGE PRISE EN CHARGE TUBERCULOSE et VIH 6 mois 2021

KMEDKTHI25- STD KIT STARTING TUBERCULOSIS and HIV CARE, 6 months 2021
KIT DEMARRAGE PRISE EN CHARGE TUBERCULOSE et VIH 6 mois 2021

Kit updated in 2021. If you need more information, please contact your HIV-AIDS advisor.

Kit mis à jour en 2021. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre référent VIH-SIDA.

INDICATIONS
Kit to integrate TB and HIV care into the global health package.
The kit contains the first order of tuberculosis and ARV drugs for the management of tuberculosis and HIV patients during 6 months. It includes the minimum drugs and tests to start.

INDICATIONS
Kit pour intégrer la prise en charge TB et VIH dans le paquet de soins globaux.
Le kit contient la première commande de médicaments antituberculeux et ARV pour la prise en charge des patients tuberculeux et VIH pendant 6 mois. Il comprend les médicaments et tests minimum pour démarrer.

SPECIFICATIONS
This kit contains a 6 months order:
• ARV module is calculated for:
– ARV treatment for 10 adults / month
– ARV treatment for 3 children / month
– ARV treatment for 5 pregnant women / month
• TB Medicines for the treatment of 10 adults + 10 children / month during 6 months
• Medicines for some opportunistic infections
• TB sample collection material
• HIV testing material

SPECIFICATIONS
Ce kit contient une commande de 6 mois:
• Le module ARV est calculé pour le :
– traitement ARV pour 10 adultes / mois
– traitement ARV pour 3 enfants / mois
– traitement ARV pour 5 femmes enceintes / mois
• Médicaments TB pour le traitement de 10 adultes + 10 enfants / mois pendant 6 mois
• Médicaments pour certaines infections opportunistes
• Matériel de prélèvement de crachats
• Matériel pour dépistage VIH

Included in: **KMEDKNUT13- STD** KIT, NUTRITION INPATIENT, 50 patients 2021
KIT NUTRITION HOSPITALISATION, 50 patients 2021

MSF Code	Composed of	Composé de	Tot Qty
L007TUBM08E-P STD	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	1
KMEDMTHI21 STD	[kit TB & HIV start] ARV MEDICINES 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS ARV 2021	1
KMEDMTHI22 STD	[kit TB & HIV start] TB MEDICINES 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS TB, 2021	1

Médecins Sans Frontières Internal Document

KMED_1 | MEDICAL KITS | KITS MÉDICAUX | III-3

MSF Code	Composed of	Composé de	Tot Qty
KMEDMTHI23 STD	[kit TB & HIV start] MEDICINES for opport. infect. 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS pr infect. opport. 2021	1
KMEDMTHI24 STD	[kit TB & HIV start] TB SPUTUM COLLECTION 2021	[kit démarrage TB & VIH] COLLECTE CRACHAT TB 2021	1
KMEDMTHI25 STD	[kit TB & HIV start] HIV tests 2021	[kit démarrage TB & VIH] TESTS VIH 2021	1

End of list

MSF Code	Related Articles	Articles apparentés	Type Relation
KMEDKTHI15- STD	KIT STARTING TUBERCULOSIS and HIV CARE, 6 months	KIT DE DEMARRAGE PRISE EN CHARGE TUBERCULOSE et VIH, 6 mois	is Replaced by

End of list

MSF Code	Detailed list of articles KMEDKTHI25-	Liste détaillée des articles KMEDKTHI25-	Qty
L007TUBM08E-P STD	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	1
KMEDMTHI21 STD	[kit TB & HIV start] ARV MEDICINES 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS ARV 2021	1
• D0RAA3LA3TD STD	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, disp. breakable tab.	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, comp. disp. sécable	3780
• D0RADOLU1TD STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, disp. tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, comp. disp.	1890
• D0RADOLU5TD STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, comp.	1890
• D0RALPVR1P STD	LPV 40 mg / r 10 mg, pellets-in-a-capsule	LPV 40 mg / r 10 mg, granules dans gélule	7560
• D0RANEV1S1 STD	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, oral susp., 100 ml, bot.	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, susp. orale, 100 ml, fl.	30
• D0RATELD1T STD	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, tab.	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, comp.	9450
• D0RAVILN1TD NST	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, dispersible tab.	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, comp. dispersible	720
KMEDMTHI22 STD	[kit TB & HIV start] TB MEDICINES 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS TB, 2021	1
• D0RAEHR2T1 STD	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, tab., blister	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, comp., blister	10080
• D0RAETHA1T1 STD	ETHAMBUTOL hydrochloride (E), eq. 100 mg base, tab. blister	ETHAMBUTOL chlorhydrate (E), eq. 100 mg base, comp. blister	2400
• D0RAHRF5T01 STD	H 50 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	4872
• D0RAHRF7T1 STD	H 75 mg / R 150 mg, tab., blister	H 75 mg / R 150 mg, comp., blister	19488
• D0RAHRZ5T01 STD	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	2436
• D0RAISON1T81 STD	ISONIAZID (I), 100 mg, breakable tab., blister	ISONIAZIDE (I), 100 mg, comp. sécable, blister	1800
• D0RAPYR11T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 10 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 10 mg, comp.	11100
• D0RAPYR15T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 50 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 50 mg, comp.	1000

Médecins Sans Frontières Internal Document

KMED_1 | MEDICAL KITS | KITS MÉDICAUX | III-4

MSF Code	Detailed list of articles KMEDKTHI25-	Liste détaillée des articles KMEDKTHI25-	Qty
• ELINMAFT1-- STD	FIT TEST KIT, qualitative testing of FFP2/N95 respirators	KIT ESSAI D'AJUSTEMENT, qualité appareils prot.resp.FFP2/N95	1
• ELINMASP04M STD	RESPIRATOR FFP2/N95 + IIR, unvalved, vert.fold, M	APPAREIL PROTECTION RESP, FFP2/N95+IIR,ss valve, pli vert. M	400
• ELINMASS3-- STD	MASK, SURGICAL, IIR type, s.u.	MASQUE CHIRURGICAL, type IIR, u.u.	400
KMEDMTHI23 STD	[kit TB & HIV start] MEDICINES for opport. infect. 2021	[kit démarrage TB & VIH] MÉDICAMENTS pr infect. opport. 2021	1
• D0RACOTR1TD STD	COTRIMOXAZOLE, 100 mg / 20 mg, disp. tab.	COTRIMOXAZOLE, 100 mg / 20 mg, comp. disp.	1890
• D0RACOTR8T STD	COTRIMOXAZOLE, 800 mg / 160 mg, tab.	COTRIMOXAZOLE, 800 mg / 160 mg, comp.	2000
• D0RAFUC2C STD	FLUCONAZOLE, 200 mg, caps.	FLUCONAZOLE, 200 mg, gél.	1000
• D0RAHPST32T STD	INH 300mg/ PYRIDOXINE 25mg/ SMX 800mg / TMP 160mg, tab.	INH 300mg/ PYRIDOXINE 25mg/ SMX 800mg / TMP 160mg, comp.	10800
• SMSUCOND1-- STD	CONDOM, lubricated + RESERVOIR, s.u.	PRESERVATIF MASCULIN, lubrifié + RESERVOIR, u.u.	2000
KMEDMTHI24 STD	[kit TB & HIV start] TB SPUTUM COLLECTION 2021	[kit démarrage TB & VIH] COLLECTE CRACHAT TB 2021	1
• ELINMASP04M STD	RESPIRATOR FFP2/N95 + IIR, unvalved, vert.fold, M	APPAREIL PROTECTION RESP, FFP2/N95+IIR,ss valve, pli vert. M	200
• SDISNADC1T STD	CHLORINE, 1 g (NaOCC / dichloroisocyan. sodium 1.67 gl. tab.	CHLORE, 1 g (NaOCC / dichloroisocyan. sodium 1,67 gl), comp.	200
• STSSCONT1S STD	CONTAINER, SAMPLE, sputum, plastic, non-sterile	POT A PRELEVEMENT, crachoir, plastique, non stérile	1200
KMEDMTHI25 STD	[kit TB & HIV start] HIV tests 2021	[kit démarrage TB & VIH] TESTS VIH 2021	1
• DEXTIDP1S2 STD	POLYVIDONE IODINE, 10%, solution, 200 ml, dropper bot.	POLYVIDONE IODÉE, 10%, solution, 200 ml, fl. verseur	1
• ELABTIME1E STD	TIMER, electronic	MINUTEUR électronique	2
• S0RECOTW5R STD	COTTON WOOL, hydrophilic, roll, 500 g	COTON hydrophile, rouleau, 500 g	1
• SSDDECT101 STD	(Determine rapid test) BUFFER CHASE, 2.5 ml, 7D2243	(test rapide Determine) TAMPON, 2.5 ml, 7D2243	10
• SSDTHVD10T STD	HIV 1 + 2 TEST (Determine), ser/pUwb, 1 test 7D2343	TEST VIH 1 + 2 (Determine), sér/pUst, 1 test 7D2343	300
• SSDTHV20T STD	HIV 1 + 2 TEST (STAT-PAK), ser/pUwb, 1 test, 60-9500-0	TEST VIH 1 + 2 (STAT-PAK), sér/pUst, 1 test, 60-9500-0	140
• SSDTHVU20T STD	HIV 1 + 2 TEST (Uni-Gold), ser/pUwb, 1 test 1206502	TEST VIH 1 + 2 (Uni-Gold), sér/pUst, 1 test 1206502	140
• STSSB5V75E STD	(bids syst.) TUBE, VACUUM, plastic, K2EDTA, 4ml, purple	(s.pré.sang.) TUBE SOUS VIDE, plastique, K2EDTA, 4ml, mauve	300
• STSSLANCSAM2 STD	SAFETY LANCET, medium flow, needle 21G x 1.8mm, green, s.u.	LANCETTE DE SECURITE débit moyen, aig.21Gx1,8mm,vert. u.u.	580

End of list

KIT TB & HIV CARE CONTINUATION in emergencies 2021

KIT POURSUITE TRAITEMENT TB & VIH en urgence 2021

KMEDKTHIE2- **STD** KIT HIV & TB CARE CONTINUATION in emergencies 2021
KIT POURSUITE TRAITEMENT VIH & TB en situat. d'urgence 2021

Kit updated in 2021. If you need more information, please contact your HIV-AIDS advisor.

INDICATIONS

Kit containing TB and HIV medicines that is intended for use in emergency situations.

This kit enables to avoid treatment interruption for patients who were under TB and/or HIV treatment before the emergency.

SPECIFICATIONS

This small kit contains:

- ARV medicines:
 - treatment for 10 adults, 5 pregnant women and 3 children / month.
 - to cover 90 adults and pregnant women and 18 children over a 6 months period plus ART prophylaxis for 5 infants.
- TB medicines:
 - 15 TB treatments for adults during intensive phase
 - 15 TB treatments for adults during continuation phase
 - 3 TB treatments for children in intensive phase
 - 3 TB treatments for children in continuation phase

It can be consumed early, if many more patients need continuation at the start of the emergency.

Kit mis à jour en 2021. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter votre référent VIH-SIDA.

INDICATIONS

Kit contenant des médicaments TB et VIH, destiné à être utilisé dans les situations d'urgence.

Ce kit permet d'éviter l'interruption du traitement pour les patients qui étaient sous traitement TB et/ou VIH avant l'urgence.

SPÉCIFICATIONS

Ce petit kit contient:

- Médicaments ARV:
 - traitement pour 10 adultes, 5 femmes enceintes et 3 enfants / mois
 - pour couvrir 90 adultes et femmes enceintes et 18 enfants sur une période de 6 mois, plus prophylaxie ART pour 5 nourrissons
- Médicaments TB:
 - 15 traitements TB adultes en phase intensive
 - 15 traitements TB adultes en phase de continuation
 - 3 traitements TB enfants en phase intensive
 - 3 traitements TB enfants en phase de continuation

Il peut être consommé rapidement, si beaucoup plus de patients doivent poursuivre leur traitement au début de l'urgence.

MSF Code	Composed of	Composé de	Tot Qty
DORAABLA3TD STD	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, disp. breakable tab.	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, comp. disp. sécable	3780
DORADOLU1TD STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, disp. tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, comp. disp.	1890
DORADOLU5T STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, comp.	1890
DORALPVR1P STD	LPV 40 mg / r 10 mg, pellets-in-a-capsule	LPV 40 mg / r 10 mg, granules dans gélule	7560

Médecins Sans Frontières Internal Document

KMED_1 | MEDICAL KITS | KITS MÉDICAUX | III-3

MSF Code	Composed of	Composé de	Tot Qty
DORANEV11S1 STD	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, oral susp., 100 ml, bot.	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, susp. orale, 100 ml, fl.	30
DORATELD1T STD	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, tab.	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, comp.	9450
DORAYLN1TD NST	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, dispersible tab.	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, comp. dispersible	720
DORAEHR2T1 STD	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, tab., blister	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, comp., blister	10080
DORAEHA1T1 STD	ETHAMBUTOL hydrochloride (E), eq. 100 mg base, tab. blister	ETHAMBUTOL chlorhydrate (E), eq. 100 mg base, comp. blister	2400
DORAHRF5TD1 STD	H 50 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	4872
DORAHRF7T1 STD	H 75 mg / R 150 mg, tab., blister	H 75 mg / R 150 mg, comp., blister	19488
DORAHZR1SD1 STD	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	2436
DORAI1SON1TB1 STD	ISONIAZID (I), 100 mg, breakable tab., blister	ISONIAZIDE (I), 100 mg, comp. sécable, blister	1800
DORAPYR11T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 10 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 10 mg, comp.	11100
DORAPYR15T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 50 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 50 mg, comp.	1000
L007TUBM08E-P STD	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	1

End of list

MSF Code	Related Articles	Articles apparentés	Type Relation
KMEDKTHI2S STD	KIT STARTING TUBERCULOSIS and HIV CARE, 6 months 2021	KIT DEMARRAGE PRISE EN CHARGE TUBERCULOSE et VIH 6 mois 2021	is Related to
KMEDKTHIE1 STD	KIT HIV & TB CARE CONTINUATION in emergencies, 50 tt	KIT POURSUITE TRAITEMENT VIH & TB en situat. d'urgence, 50tt	is Replaced by

End of list

MSF Code	Detailed list of articles KMEDKTHIE2-	Liste détaillée des articles KMEDKTHIE2-	Qty
DORAABLA3TD STD	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, disp. breakable tab.	ABC 120 mg / 3TC 60 mg, comp. disp. sécable	3780
DORADOLU1TD STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, disp. tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 10 mg base, comp. disp.	1890
DORADOLU5T STD	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, tab.	DOLUTEGRAVIR sodium (DTG), eq. 50 mg base, comp.	1890
DORALPVR1P STD	LPV 40 mg / r 10 mg, pellets-in-a-capsule	LPV 40 mg / r 10 mg, granules dans gélule	7560
DORANEV11S1 STD	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, oral susp., 100 ml, bot.	NEVIRAPINE (NVP), 50mg/5ml, susp. orale, 100 ml, fl.	30
DORATELD1T STD	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, tab.	TDF 300mg / 3TC 300mg / DTG 50mg, comp.	9450
DORAYLN1TD NST	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, dispersible tab.	AZT 60 mg / 3TC 30 mg / NVP 50 mg, comp. dispersible	720
DORAEHR2T1 STD	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, tab., blister	E 275 mg / H 75 mg / Z 400 mg / R 150 mg, comp., blister	10080
DORAEHA1T1 STD	ETHAMBUTOL hydrochloride (E) eq 100 mg base tab blister	ETHAMBUTOL chlorhydrate (E) eq 100 mg base comp blister	2400
MSF Code	Detailed list of articles KMEDKTHIE2-	Liste détaillée des articles KMEDKTHIE2-	Qty
DORAHRF5TD1 STD	H 50 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	4872
DORAHRF7T1 STD	H 75 mg / R 150 mg, tab., blister	H 75 mg / R 150 mg, comp., blister	19488
DORAHZR1SD1 STD	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, disp. tab., blister	H 50 mg / Z 150 mg / R 75 mg, comp. disp., blister	2436
DORAI1SON1TB1 STD	ISONIAZID (I), 100 mg, breakable tab., blister	ISONIAZIDE (I), 100 mg, comp. sécable, blister	1800
DORAPYR11T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 10 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 10 mg, comp.	11100
DORAPYR15T STD	PYRIDOXINE hydrochloride (vitamin B6), 50 mg, tab.	PYRIDOXINE chlorhydrate (vitamine B6), 50 mg, comp.	1000
L007TUBM08E-P STD	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	HIV/TB Integration. Interim guidance document.	1

End of list

الملحق 4: أمثلة على مخططات / تنظيم خدمات فيروس نقص المناعة البشرية / السل على مستوى المستشفى وعيادة الرعاية الصحية الأولية

الشكل 1. مثال على أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية والسل على مستوى المستشفى

الشكل 2: خدمات فيروس نقص المناعة البشرية والسل في عيادة الرعاية الصحية الأولية

الملحق 5: قائمة الموارد المتاحة / المبادئ التوجيهية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والاختبار والتشخيص

- مبادئ توجيهية موحدة بشأن خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية من أجل وباء متغير
<https://www.who.int/publications/i/item/consolidated-guidelines-on-hiv-testing-services-for-a-changing-epidemic>
- مبادئ توجيهية بشأن الاختبار الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية وإخطار المثيرك: ملحق للمبادئ التوجيهية الموحدة بشأن خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ؛ منظمة الصحة العالمية 2016 E :
<https://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/>.
- إرشادات حول الاستشارة والاختبار الذي بدأه مقدم الخدمة في الهياكل الصحية ، منظمة الصحة العالمية 2007 E / F :
<https://www.who.int/hiv/pub/vct/pitc/en/>
- إرشادات بشأن موعد بدء العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية وبشأن الوقاية قبل التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية
<https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/>

الوقاية من مرض السل والفحص والتشخيص ومكافحة العدوى

- إرشادات MSF PIH 2014 بشأن السل (قيد التحديث)
- أطباء بلا حدود ، كتيب تصميم المرافق الصحية لمرض السل ، أطباء بلا حدود ، 2017
- دليل لرصد وتقييم الأنشطة التعاونية لمكافحة السل / فيروس نقص المناعة البشرية ، مراجعة 2015:
<https://www.who.int/tb/publications/monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/>
- توحيد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل: الوحدة 1: الوقاية: العلاج الوقائي من السل ، تحديث منظمة الصحة العالمية 2020:
<https://www.who.int/publications/i/item/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-1-prevention-tuberculosis-preventive-treatment>
- الدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من عدوى السل ومكافحتها ، تحديث 2019
<https://www.who.int/tb/publications/2019/guidelines-tuberculosis-infection-prevention-2019/en/>
- مبادئ توجيهية بشأن المكونات الأساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني ومستوى مرافق الرعاية الصحية الحادة:
<https://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/>
- أشعة الصدر السينية و السل: https://www.who.int/tb/publications/Radiography_TB_factsheet.pdf?ua=1 ،
<https://www.who.int/tb/publications/chest-radiography/en/> ،
(يقدم الفصل 1.4 نظرة عامة جيدة على استخدام الأشعة السينية للصدر)
- الموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS): رابط إلى الفصل 18 من دليل الموجات فوق الصوتية لأطباء بلا حدود للممارسين المرئيين - الذي يناقش اختبار (HIV-TB) FASH:
https://msfintl.sharepoint.com/:b/s/msfintlcommunities/DIWG/ESYiQgPbYnZnTzVi_T4xVA4BDYM_Gryc4304a0l0m6_zCqg?e=eHcSHL
- Heller T, wallrauch C, Goblirsch S, Brunetti E التقييم الموكز مع التصوير فوق الصوتي للسل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية (FASH): بروتوكول قصير ومراجعة تصويرية:
Crit Ultrasound J. 2012 Nov 21;4(1):21. Doi 10.1186/2036-7902-4-21.
- Heller T. FASH: التقييم الموكز مع التصوير فوق الصوتي لفيروس نقص المناعة البشرية / السل. دليل عملي. ميونخ المانيا. TALC- وسائل تعليمية بتكلفة منخفضة. 2013. ISBN:978-0-9558811-8-3 .

تثقيف المريض ، الاستشارة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والالتزام

- إرشادات لدعم المرضى والتعليم والإرشاد: للبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و / أو السل ، تحديث 2018:
https://samumfsf.org/sites/default/files/2018-09/PSEC_Adults%20MSF%20Guideline.pdf
- إرشادات لدعم المرضى والتعليم والإرشاد: للأطفال والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، تحديث 2018:
https://samumfsf.org/sites/default/files/2018-06/PSEC_Children%20and%20adolescents_0.pdf

إرشادات العلاج والاستشارة حول فيروس نقص المناعة البشرية / السل والوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل

- بروتوكولات البرنامج الوطني
- دليل أطباء بلا حدود لفيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل للرعاية الأولية (2018):
<https://samumfsf.org/en/resources/msf-hivtb-clinical-guide-2018#>

- الدلائل الإرشادية الموحدة بشأن استخدام العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية لعلاج ومنع عدوى فيروس العوز المناعي البشري ، توصيات لنهج الصحة العامة - الطبعة الثانية منظمة الصحة العالمية 2016.

<https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/>

- تحديث التوصيات بشأن أنظمة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من الخط الأول والثاني: منظمة الصحة العالمية ، يوليو / تموز 2019

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325892/WHO-CDS-HIV-19.15-eng.pdf?ua=1>

- توصيات محدثة بشأن أنظمة الخط الأول والخط الثاني من مضادات الفيروسات القهقرية والوقاية بعد التعرض والتوصيات بشأن التشخيص المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية عند الرضع: إرشادات مؤقتة منظمة الصحة العالمية

<https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV2018update/en/:2018>

- الملحق 3. جرعات الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/ARV_Guidelines-2018-Annex3a.pdf?ua=1

- الدلائل الإرشادية لعلاج السل حساس للأدوية ورعاية المرضى - تحديث 2017

https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/

- الدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة والريفامبيسين 2018 تحديث ؛

<https://www.who.int/tb/publications/2019/consolidated-guidelines-drug-resistant-TB-treatment/en/>

متوفر أيضا من خلال:

<https://samumfsf.org/en/resources/tb/dr-tb/who-consolidated-guidelines-on-dr-tb-treatment-2019>

- إرشادات MSF PIH 2014 بشأن السل (قيد التحديث)

موقع SAMU : <https://samumfsf.org/en>

- دليل لوصد وتقييم الأنشطة التعاونية لمكافحة السل / فيروس نقص المناعة البشرية ، مراجعة 2015:

<https://www.who.int/tb/publications/monitoring-evaluation-collaborative-tb-hiv/en/>

- دليل تنقيف وإرشاد المرضى بشأن + PMTCT B ، OCB نيسان 2013

<https://samumfsf.org/sites/default/files/2018->

[06/4_english_Patient_education_and_counselling_guide_for_PMTCT.pdf](https://samumfsf.org/sites/default/files/2018-06/4_english_Patient_education_and_counselling_guide_for_PMTCT.pdf)

- الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل (PMTCT) لبروتوكول فيروس نقص المناعة البشرية: مجموعة العمل الدولية المعنية بالإيدز التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ، المنقحة في آب 2017

https://samumfsf.org/sites/default/files/2019-02/PMTCT%20Guidelines_2017.pdf

إدارة بيانات فيروس نقص المناعة البشرية: المراقبة والتقييم

- MSF DHIS2 و DHIS2 (في عملية التطوير)

- ثلاثة أنظمة مترابطة لوصد المرضى لرعاية فيروس نقص المناعة / العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، وصحة الأم والطفل / منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ، وفيروس نقص المناعة البشرية / السل: الحد الأدنى للبيانات وأدوات توضيحية (مراجعة منظمة الصحة العالمية 2013):

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77753/9789241598156_eng.pdf?sequence=1

- التعريف وإطار الإبلاغ عن السل (تحديث منظمة الصحة العالمية ، كانون الأول 2014):

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79199/9789241505345_eng.pdf?sequence=1

- ملحق دليل السل 32 ، 33 ، 34 ، 35 (MSF ، PIH 2014)

دمج وتكييف COVID 19 في أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل

- تكامل وتكييف أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل مع وجود COVID 19.

<https://msfintl.sharepoint.com/sites/msfintlcommunities/AWG/Resources/Forms/AllItems.aspx?vieid=145cd5f1%2D898d%2D419c%2Dbd1f%2D8c33c1cb4389&id=%2Fsites%2Fmsfintlcommunities%2FAWG%2FResources%2FCOVID%2D19%2F01%2D%20MSF%20guidance%20and%20tools>

الملحق 6: مثال على الوضع المالي

يرجى الاطلاع أدناه على الميزانية التقديرية لكل مريض لمشروع اختبار وعلاج Yambio ، والذي كان عبارة عن اختبار وبدء برنامج مجتمعي لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية. يجب تعديل هذه التكاليف وفقًا لتوفر الموارد: يتم تغطية العلاج المضاد للفيروسات القهقرية بشكل عام من قبل الصندوق العالمي وتطلب منظمة أطباء بلا حدود توريد شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط يتم تغطية الحمل الفيروسي في بعض البلدان أيضًا من قبل وزارة الصحة أو GF ؛ في المكونات المتكاملة ، قد لا تحتاج إلى توظيف أي مورد محدد وستعتمد التكلفة لكل مريض على درجة الراتب. لا يتم تضمين تكاليف التدريب في الحساب:

كلفة كل مريض

السبب	الكلفة	ملاحظات
موظفين	\$67	ستعتمد على درجة الراتب وعدد الموظفين اللارمين يشمل الموظفون فريق العيادة المتنقلة المكون من ؛ مسؤول طب سريري ، وممرض مستشار ، وفني مختبر ، وعاملان في صحة المجتمع ، وسائق
عقاقير	\$84	هذه هي مهمة الخط الأول الكاملة ؛ في حالة الطلب لمدة 3 أشهر فقط لكل مريض ، ستنخفض التكلفة إلى 21 دولارًا
مخبر	\$35	سيعتمد ذلك على ما إذا كانت بعض الاختبارات (مثل الحمل الفيروسي) مغطاة بفاعلية خارجية (عند استخدام اختبار نقطة الرعاية ، تبلغ تكلفة Xpert حوالي 15000 يورو بينما تبلغ تكلفة 8 cartridges دولارات أمريكية)
مواصلات	\$6	إذا كانت المنشأة قائمة ، يمكن استبعاد هذه التكلفة. تم تضمينه في إطفاء سيرة مع متوسط العمر المتوقع لعشر سنوات مع تكاليف الصيانة ذات الصلة
مصاريف أخرى	\$7	
الاجمالي	\$199	

الملحق 7: دراسات عملية

دراسة الحالة 1: ملكال: تكامل رعاية فيروس نقص المناعة البشرية / السل

(مثال على تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / السل على مستوى المستشفى في منطقة بها فجوة علاجية تزيد عن 90٪)

وصف موجز: يقع مشروع ملكال في منطقة أعالي النيل بجنوب السودان. حاليًا، تدير مشفين (في بلدة ملكال و POC) وتغطي عدد سكان يبلغ 50.000 شخص. في عام 2017، قرر المشروع دمج أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل في الأولويات الطبية الأخرى المنافسة، حيث كانت فجوة العلاج أكثر من 90٪، وكان عبء فيروس نقص المناعة البشرية / السل مرتفعًا، ولم تكن وزارة الصحة والجهات الفاعلة الأخرى تقدم الرعاية لفيروس نقص المناعة البشرية / السل.

علم الأوبئة: في جنوب السودان، يبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية 2.7٪ ونسبة الإصابة بالسل 150 لكل 100.000 نسمة. يُعتقد أن معدل الإصابة بالسكان النازحين أعلى بثلاث مرات.

السياق: نزاع طويل الأمد و السكان في حال تنقل دائم، يوجد العديد من القرى ولكن معظم السكان يعيشون إما في المدينة أو في منطقة حماية المدنيين. انهزلت وزارة الصحة بعد الصراع العرقي في عام 2013. الجهات الفاعلة الإنسانية تقدم الرعاية الصحية؛ فقط IMC يوفر PMTCT.

العيادة: يدير المشروع مستشفيين، بما في ذلك IPD (للبالغين والأطفال وحديثي الولادة والأمومة) والعيادات الخارجية والتطعيمات والتوعية وأنشطة watsan.

مشروع تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل: بعد عامين من برنامج فيروس نقص المناعة البشرية / السل، تم تأسيس المشروع بشكل جيد. يقومون بإجراء VCT بالإضافة إلى رعاية PICT و PMTCT و HIV و TB-DRTB؛ اكتمل المختبر تمامًا، مع جهاز PIMA (اختبار CD4)، Xpert MTB / RIF مع خطط للتوسع إلى HIV VL و EID، والتي يتم إجراؤها حاليًا بواسطة مختبر الإحالة. يحتوي المشروع على إستراتيجية مجتمعية مع أنشطة HPCE ومستشار محدد لفيروس نقص المناعة البشرية / السل.

دراسة الحالة الثانية: جمهورية إفريقيا الوسطى: دمج تقديم الخدمات المتمايزة (DSD) لخدمات ART

(مثال على دمج خدمات DSD)

الوصف: تدير منظمة أطباء بلا حدود عيادة للرعاية الصحية الأساسية في بوجيلا منذ عام 2007 مع أنشطة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في الجزء الشمالي النائي من البلاد. يحتوي موقع بوجيلا للتوعية على مرفق واحد لصحيفة بيتا للتخزين (BHC) ومركز صحي. تشمل الأنشطة العيادات الخارجية، والملاريا، واللقاحات، و ANC / PMTCT، والتوعية، وأنشطة Watsan. في السنوات الست الماضية، كانت الفرق مشغولة للغاية في الاستجابة لحالات الطوارئ. ونتيجة لذلك، تم تعليق اختبار فيروس نقص المناعة واقصرت أنشطة فيروس نقص المناعة / السل على استمرار العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، وعلاج السل المنقذ للحياة، ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وتتبع المفقودين للمتابعة. وقد هدأ الوضع الآن، وتحرص كل من وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود على توسيع أنشطة فيروس نقص المناعة البشرية / السل وتحسين الوصول من خلال تنفيذ تقديم الخدمات المتمايزة (DSD) لخدمات العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

علم الأوبئة: يبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية حوالي 4٪، ونسبة الإصابة بالسل ليست عالية جدًا (استمر اختبار السل من خلال الإحالات إلى باوا أو بوسانغوا). هناك حالات مفترضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في العيادات الخارجية، و ANC وبرنامج التغذية.

السياق: ريفي. لا يوجد موفر رعاية صحية لفيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل في مكان قريب تحيل منظمة أطباء بلا حدود جميع مرضاها إلى مستشفى بوسانغوا باستخدام الدرجات النارية أو بالطائرة. تدعم منظمة أطباء بلا حدود أنشطة فيروس نقص المناعة / مرض السل في IPD في مستشفى بوسانغوا. كما تدعم منظمة أطباء بلا حدود المختبر من خلال GeneXpert حيث يتم إجراء اختبار السل والحمل الفيروسي.

مشروع تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل: قرر المشروع تنفيذ DSDs بما في ذلك مجموعات ART المجتمعية، وتباعد المواعيد، والمسار السريع واستئناف اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والسل (PICT) بالإضافة إلى عبوات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ومضادات الفيروسات القهقرية / السل.

وانفقوا على إحالة المرضى وعينات السل وعينات الحمل الفيروسي وعينات لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية عند الرضع إلى مستشفى بوسانغوا. وبالتعاون مع وزارة الصحة، يعملون على تنفيذ DSDs للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) و PWTB على مستوى المركز الصحي والمجتمع. لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية يستخدمون الاختبارات السريعة ويحيلون إلى مستشفى Bossangoa للتأكيد مع Xpert. يستخدمون سجلات الاستشارة الورقية / PMTC / ART المستندة إلى وزارة الصحة، وبطاقات الهوية المضادة للفيروسات القهقرية والسل، وإرسال الحد الأدنى من المؤشرات / الأرقام إلى وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود للمراقبة والتقييم. تعد خطة الطوارئ جزءًا من حزمة DSD وقد بدأ التوسع بربط المرضى الجدد بـ DSD.

دراسة حالة 3: جمهورية إفريقيا الوسطى: دمج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في الأمومة في كاستور (بانغي)

الوصف: في بانغي ، تدعم منظمة أطباء بلا حدود مشروعًا عموديًا يركز على الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية. تشمل الأنشطة الأمومة والعنف الجنسي والجسدي وتنظيم الأسرة. تم دمج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في جميع الخدمات ، ولكن لا يوجد المزيد من الرعاية. تم تزويد النساء بمضادات الفيروسات العكوسة لمدة شهر واحد والأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية مع إمداد شهر واحد بالوقاية من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية وإحالتهم إلى المراكز الصحية دون مزيد من المتابعة. وأُعربت الفرق العاملة عن قلقها إزاء عدم متابعة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية وعدم متابعة النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية التي تم تحديدها وبالتالي حالات الانتقال الرأسي للفيروس التي يمكن الوقاية منها.

علم الأوبئة: انتشار فيروس نقص المناعة البشرية هو 7% في بانغي ، ولكن الوصول إلى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ضعيف للغاية والعديد من النساء الحوامل لم يتلقين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو الوصول إلى خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. تبلغ نسبة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل اللائي يأتين للولادة 6%. **السياق:** حضري. يتم دعم بعض المراكز الصحية من قبل الشركاء المنفذين لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. يهدف البرنامج الوطني إلى دمج منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل في جميع مراكز رعاية الأطفال الرضع.

مشروع تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل: قرر المشروع تحسين تكامله مع فيروس نقص المناعة البشرية في نهج تدريجي. نظرًا لعدم وجود قدرة أو طموح للمشكلة في ANC ، وافق الفريق على البدء في تحسين متابعة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية المولودين في كاستور. قام أحد المنفذين المتخصصين بدعم تنفيذ المكونات التالية:

- تكامل التشخيص المبكر للرضع (EID) مع تطبيق GeneXpert في مختبر تم تطويره (على أي حال).
- استشارة مخصصة في كاستور لمتابعة الأطفال المعرضين لفيروس نقص المناعة البشرية بعد الولادة لمدة 6 أسابيع حيث يتم إجراء اختبار العيد.
- نظام الإحالة إلى مستشفى الأطفال لبدء العلاج المضاد للفيروسات القهقرية في وقت مبكر للأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم EID +.
- فحص أفضل للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية مع توفير CD4 وحوارضية لفحص الأمراض المتقدمة.
- نظام إحالة النساء المريضة إلى المستشفى وتنفيذ نظام الإحالة المضادة مع المراكز الصحية مع منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل حيث يمكن متابعة النساء بشكل أكبر وتعزيز التواصل بحيث يمكن تصميم نظام بناء القدرات / نهج التوجيه مع المراكز الصحية الأخرى يتم تصميمها بشكل أكبر.

دراسة حالة 4: غينيا كوناكري: دمج رعاية فيروس العوز المناعي البشري في مراكز الصحة الأولية كاستراتيجية لاهركزية في سياق انتشار منخفض

وصف موجز: في كوناكري ، غينيا ، تدعم منظمة أطباء بلا حدود مشروعًا أساسيًا ضخمًا وشاملاً لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في مركز صحي كان مزدحمًا بمجموعة كبيرة من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية + (< 10000). كانت اللاهركزية إلى المراكز الصحية الأخرى في المدينة هي الخطوة التالية التالية ، لكن الفريق ووزارة الصحة اتفقا على أن نموذج اللاهركزية سيعتمد على دمج رعاية فيروس نقص المناعة البشرية ضمن بقية الأنشطة في 6 مراكز صحية حيث لم تكن هناك قدرة على التنفيذ الرأسي برامج في كل منها.

علم الأوبئة: في كوناكري ، معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية هو 2.3% في وباء عام.

السياق: المناطق الحضرية ، حيث لا يمثل فيروس نقص المناعة البشرية المشكلة الرئيسية ، في حين أنه وباء عام ، يمكن أن يكون الانتشار في مجموعات محددة مثل KP أعلى بعشر مرات. كان توفير الرعاية محدودًا للغاية لعدد قليل فقط من المراكز الصحية التي كان لديها مجموعات متنامية يصعب الحفاظ عليها.

مشروع تكامل فيروس نقص المناعة البشرية / مرض السل: على هذا النحو ، تألف فريق منظمة أطباء بلا حدود من الأطباء والمستشارين و فريق الرصد والتقييم الذي من شأنه أن يتناوب عبر العيادات لتحقيق اللاهركزية لتدريب فرق وزارة الصحة في العيادات وتزويدهم بنهج إرشادي. بشكل تدريجي ، دمج الأطباء في استشاراتهم استشارات المتابعة للمرضى المحالين من ماتام وقاموا بتنفيذ الأنظمة لاستيعاب ومراقبة مجموعة مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الخاصة بهم. صممت منظمة أطباء بلا حدود خطة إرشادية لدعم جميع مكونات البرنامج في كل مرفق رعاية صحية. تغطي خطة التوجيه الاستشارات العامة ، والدعم المخبري ، ودعم الصيدلة ، ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. تتم تغطية الموضوعات بشكل تدريجي ودعم منظمة أطباء بلا حدود بالإضافة إلى المراقبة وإحالة العينات والدعم الفني ومناقشة الحالات الصعبة وتقييم تقدم الأداء ، وبناء فرق مستقلة في كل من المرافق الصحية التي تتعامل مع مجموعات تضم ما بين 1500 و 2500 مريض.

دراسة الحالة 5: ماداوا (النيجر): دمج رعاية فيروس نقص المناعة / السل في برنامج التغذية للأطفال

وصف موجز: ماداوا هي مدينة في منطقة تاهوا (في النيجر) عرضة للصراع ، ويبلغ عدد سكانها 450.000 نسمة. الأمراض القاتلة الرئيسية هي الملاريا وسوء التغذية ، وهما موسميان. في عام 2010 ، افتتحت منظمة أطباء بلا حدود ITFC و ATFC و IPD لأقل من 5 سنوات. يبلغ متوسط الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد 2200 سنويًا والوفيات حوالي 4٪ ، في حين يتم إدخال حوالي 1500 مريض إلى المستشفى بمعدل وفيات يبلغ 5.4٪.

علم الأوبئة: في عام 2016 ، كان معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية أقل من 1٪ ولكن إيجابية فيروس نقص المناعة البشرية في بنك الدم كانت 8٪.

التقييم: رعاية فيروس نقص المناعة تحت إشراف وزارة الصحة ولكن لا توجد خدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل ، وعدم الوصول إلى DNA PCR ، وعدم توفر توكيات الأطفال ، وعدم وجود مثبطات للبروتياز في جميع البلدان ؛ لم يكن الموظفون مدربين ، وكانت انتشار الشعور بوصمة العار عالية جدًا.

مشروع تكامل فيروس نقص المناعة / السل: اختبار منهجي لفيروس نقص المناعة البشرية في ITFC ، فيروس نقص المناعة للأطفال

الأهداف	اختبار فيروس نقص المناعة المنهجي في ITFC	علاج فيروس نقص المناعة
ماذا	اختبار فيروس نقص المناعة الاستشارة قبل الاختبار في المجموعة الاستشارة بعد الاختبار اختبار للأطفال إذا كانت الأم مصابة بفيروس نقص المناعة	علاج ART و CTX المراقبة السريرية المعمل CD4 & VL :جهاز Xpert استشارات الالتزام
أين	ITFC	عيادة فيروس نقص المناعة ، مخبر (CD4 / VL)
لمن	سوء التغذية الحاد الشديد مع مضاعفات طبية	الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة
من	ممرضة	ممرضة